

## Appendix I

Voorbeeld: Overzicht met aanvullende diagnostiek op basis van BSR-richtlijn.

| Onderdeel  | Eerste beoordeling | Beoordeling (actieve ziekte)<br>Patiënten met actieve ziekte zouden ten minste elke 1-3 maanden beoordeeld moeten worden | Monitoring (stabiele ziekte)<br>Patiënten met stabiele/lage ziekteactiviteit zouden elke 6-12 maanden gemonitord moeten worden |
|--|--------------------|--|--|
| <b>Anamnese en lichamelijk onderzoek</b>   |                    |  |  |
| Gedetailleerde anamnese  | X                  | Specifieke anamnese  | Specifieke anamnese  |
| Lichamelijk onderzoek  | X                  | X  | X <sup>a</sup>   |
| Vitale functies (bloeddruk, hartslag, gewicht)   | X                  | X  | X <sup>a</sup>   |
| Medicatieoverzicht inclusief   | X                  | X <sup>a</sup>   | X <sup>a</sup>   |
| Vaccinatie status  | X                  | X <sup>a</sup>   | X <sup>a</sup>   |
| <b>Bloed</b>   |                    |  |  |
| Volledig bloedbeeld  | X                  | X  | X  |
| Overige testen voor anemie   | X <sup>a</sup>     | X <sup>a</sup>   | X <sup>a</sup>   |
| Renale functie   | X                  | X  | X  |
| Transaminases  | X                  | X  | X  |
| Creatine kinase  | X                  | X <sup>a</sup>   | X <sup>a</sup>   |
| CRP en BSE   | X                  | X  | X  |
| Vitamine D   | X                  | X <sup>a</sup>   | X <sup>a</sup>   |
| Schildklier functie  | X                  | X <sup>a</sup>   | X <sup>a</sup>   |
| <b>Immunologie</b>   |                    |  |  |
| ANA  | X                  | -  | -  |
| Anti-dsDNA *   | X                  | X <sup>a</sup>   | X <sup>a</sup>   |
| C3/C4 complement *   | X                  | X <sup>a</sup>   | X <sup>a</sup>   |
| LAC, aCL, anti-B2GP-1 **   | X                  | X <sup>a</sup>   | X <sup>a</sup>   |
| Anti-Ro/La, anti-RNP en anti-Sm antistoffen  | X                  | -  | -  |
| Anti-C1q antistoffen   | X <sup>a</sup>     | X <sup>a</sup>   | X <sup>a</sup>   |
| Immunglobulines  | X                  | X <sup>a</sup>   | X <sup>a</sup>   |
| Direct Coombs' test  | X                  | X <sup>a</sup>   | X <sup>a</sup>   |
| <b>Urine</b>   |                    |  |  |
| Urinesediment  | X                  | X <sup>a</sup>   | X <sup>a</sup>   |
| 24-uur urine of de eiwit/creatinine ratio  | X                  | X <sup>a</sup>   | X <sup>a</sup>   |
| Urinekweek   | X <sup>a</sup>     | X <sup>a</sup>   | X <sup>a</sup>   |
| Urinemicroscopie (en kweek)  | X <sup>a</sup>     | X <sup>a</sup>   | X <sup>a</sup>   |
| <b>Overig</b>  |                    |  |  |
| ECG  | X                  | X <sup>a</sup>   | X <sup>a</sup>   |
| <b>Beeldvorming</b>  |                    |  |  |
| Thorax röntgenfoto   | X                  | X <sup>a</sup>   | X <sup>a</sup>   |
| <b>Factoren cardiovasculair risico</b>   |                    |  |  |
| Hypertensie  | X                  | X <sup>a</sup>   | Elke 12 maanden  |
| Dyslipidaemie  | X                  | X <sup>a</sup>   | Elke 12 maanden  |
| Diabetes Mellitus  | X                  | X <sup>a</sup>   | Elke 12 maanden  |
| BMI  | X                  | X <sup>a</sup>   | Elke 12 maanden  |
| Roken  | X                  | X <sup>a</sup>   | Elke 12 maanden  |
| Onvoldoende lichaamsbeweging <sup>b</sup>  |                    |  |  |
| aCL: anticardiolipine; LAC: lupus anticoagulans; anti-B2GP-1: anti-B2-glycoproteïne 1. |                    |  |  |
| <sup>a</sup> Op indicatie  |                    |  |  |
| <sup>b</sup> Nederlandse Norm Gezond bewegen   |                    |  |  |

\* Gelijktijdig monitoren anti-dsDNA en C3/C4 complement geadviseerd  
\*\* Indien positief herhalen na 12 weken