

Adjuvante behandeling na initiële behandeling

Literatuurbespreking:

Chemotherapie

De waarde van adjuvante chemotherapie bij deze tumoren is onduidelijk. Op basis van twee studies met in totaal 14 patiënten is het in de Verenigde Staten gebruikelijk om drie BEP-kuren te geven bij Sertoli-Leydigceltumoren graad 3 of met heterologe componenten [Gershenson 2012⁹]. Totdat de resultaten bekend zijn van een lopende studie waarin BEP wordt vergeleken met carboplatin/paclitaxel, is dit evenwel geen standaard beleid. Bij niet-resectabele ziekte, kan palliatieve systemische therapie worden overwogen.

Op basis van een andere studie bij 14 patiënten kan lokale of volledige abdominale radiotherapie worden overwogen, indien bij een granulosa-celtumor lokaal tumor achterblijft [Wolf 1999²⁵].

Op dit moment is er te weinig evidence voor chemotherapie in de adjuvante setting. Evidence voor een gunstig effect van chemotherapie in advanced en recidief setting is aan kritiek onderhevig [Van Meurs 2014²³]. De GOG-0264 studie naar de waarde van BEP versus carboplatin/paclitaxel wordt afgewacht [Gurumurthy 2014¹¹].