

Doelgroep: voor KNO artsen die septumdeviaties diagnosticeren of septumcorrecties uitvoeren.  
Doel: input verzamelen om aanbevelingen te formuleren die aansluiten bij de klinische praktijk.

Algemene informatie:

Soort lidmaatschap:  KNO-arts  
 AIOS

Indien KNO-arts, hoelang bent u in dienst?

- 0-5 jaar  
 5-10 jaar  
 10-20 jaar  
 >20 jaar

Vragen

1. Welk onderzoek gebruikt u om de diagnose 'neusobstructie door septumdeviatie' te stellen?
  - rhinoscopia anterior
  - nasendoscopie
  - PNIF test of andere functietest
  - anamnese gericht op neuspassageklachten of geobjectiveerd met gevalideerde vragenlijst
  - NOSE scale
  - anders namelijk...
2. Zijn er nog standaard stappen die u neemt alvorens de indicatie tot opereren te stellen?
  - nasaal steroïde
  - afwachtend beleid
  - spoelen van de neus
  - conchabehandeling
  - proefperiode met neusspray
  - proefperiode met neusspreider
  - anders namelijk...
3. Welke criteria hanteert u om de indicatie voor een septumcorrectie te stellen?  
(uitkomstwaarden van diagnostiek genoemd in vraag 2; of invloed op QOL)
4. Voert u ook septumcorrecties bij jongeren onder de 18? Zo ja, vanaf welke leeftijd?
  - Nee
  - Ja
    - Leeftijd: ...
5. Vindt u dat er altijd een periode conservatief beleid moet worden gevolgd alvorens een septumcorrectie geïndiceerd kan worden?
6. Zijn er aanvullende verrichtingen die u uitvoert gecombineerd met een endonasale septumcorrectie ter verbetering van de neuspassage?
  - Conchachirurgie
  - endonasale spreadergrafts

- anders, namelijk...)

7. Op welke momenten na de operatie ziet u de patiënten terug. Graag alle controlemomenten hieronder benoemen

- 0-7 dagen
- 1-6 weken
- 6 weken tot 6 maanden
- 6-12 maanden
- >12 maanden

8. Gebruikt u routinematig een instrument om het effect van de operatie te meten? Zo ja, welke?

- Nee
- Ja
  - PNIF test of andere functietest
  - anamnese gericht op neuspassageklachten of geobjectiveerd met gevalideerde vragenlijst
  - NOSE scale
  - anders namelijk...