

Appendix I

Tabel 1. Handvat voor organisatie van zorg in de follow-up: wie controleert wat?

Controle	Wie	Frequentie
Bloeddruk	Huisarts/ POH	Week 1 en op indicatie vaker hangt ook af van bloeddruk en controle afspraken ziekenhuis
Glucose	Huisarts/ POH	In ieder geval in week 1 na start prednisolon, daarna 1 maal per 2 weken en indien nodig vaker hangt ook af van glucose spiegel en controle afspraken ziekenhuis
Ziekteactiviteit (op basis klachten en symptomen) te samen met lab waaronder BSE/CRP	Medisch Specialist/ VS/ PA/ Reumaconsulent	Week 0, 2, 6 en 12 en daarna iedere 3 maand
Medicatie – GCD dosis en bijwerkingen	Medisch Specialist/ VS/ PA/ Reumaconsulent	Bij iedere controle
Medicatie – cs/bDMARDs dosis en bijwerkingen	Medisch Specialist/ VS/ PA/ Reumaconsulent	Bij ieder controle
Osteoporose door middel van fractuurrisico inventarisatie (o.a. anamnese, botdichtheidsmeting en wervelfractuur opsporing)	Medisch Specialist/ VS/ PA/ Reumaconsulent	Raadpleeg bij aanvang van de GC therapie de richtlijn Fractuurpreventie (hoofdstuk GIOP).
Optreden van infecties	Huisarts/ POH / op indicatie medisch specialist	Bij klachten patiënt
Cardiovasculaire risico (CVRM)	Huisarts/ POH Bij start tocilizumab door Medisch Specialist/ VS/ PA/ Reumaconsulent	Volgens richtlijn Cardiovasculair risicomangement (CVRM)
Vaccinaties	RIVM reguliere programma Huisarts/ POH Varicella Zoster en Pneumokokken vaccinatie jonger dan 60 jaar Medisch Specialist/ VS/ PA/ Reumaconsulent	volgens richtlijn vaccinaties bij chronische inflammatoire aandoeningen

POH= praktijkondersteuner, VS = verpleegkundig specialist, GC = glucocorticoïden, PA= physican assistent