

Bijlage 14A. SYMPTOOMSCOREFORMULIER DUBBELBLINDE PLACEBOGECONTROLEERDEKOEMELK PROVOCATIE 2^E EN 3^E LIJN

Betreft **0 TEST DAG 1** (Voor zowel TEST DAG 1 en TEST DAG 2 wordt dit formulier ingevuld)
0 TESTDAG 2

Naam kind:

Geboorte datum:

Testdatum:.....

0 Type testvoeding :

0 Infuus hoeft niet ingebracht

0 Infuus ingebracht

Voorbeeld registratie van symptomen

	Dosis 1 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 2 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 3 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 4 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 5 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 6 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 7 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 8 Tijd:	Reactie Tijd:
Tijdstip	8.00		8.30		09.00											
Symptomen																
Jeuk						09.20										

	Dosis 1 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 2 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 3 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 4 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 5 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 6 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 7 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 8 Tijd:	Reactie Tijd:
Tijdstip																
Symptomen																
Jeuk																
Roodheid																
Lokale urticaria																
Gegenerali- seerde urtica- ria																
Zwelling																
Overig																
Gastro- intestinaal																
Angio-oedeem van de lippen, tong en gehe- melte																
Jeuk in de mond																
(Krampende) buikpijn																
Misselijkheid																
Spugen (een- malig)																

	Dosis 1 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 2 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 3 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 4 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 5 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 6 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 7 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 8 Tijd:	Reactie Tijd:
Herhaald spu- gen																
Diarree																
Overig																
Respiratoir																
Neusobstructie																
Niezen																
Conjunctivitis																
Loopneus																
Gevoel van zwellings keel																
Stridor/ Hees- heid																
Hoesten																
Moeilijk slikken																
Benauwdheid																
Astma aanval																
Overige																
Cardio- Vasculair																

Medicatie gegeven? 0 nee, 0 ja, namelijk

0 antihistaminicum per os/iv
0 luchtwegverwijders
0 adrenaline
0 anders, nl.:

Lichamelijk onderzoek aan einde testdag

Algemene indruk:

Hals/Hoofd:

Longen:

Huid: (*vul TIS-score in*)

Naam beoordelaar:

Bloeddruk:

Hartfrequentie:

Temperatuur°C

Piekstrooml/min

Saturatie (O₂)%

Overig:

Te ondernemen acties:

0 Belafsprak met ouders voor over 48 uur

0 Symptoomscoreformulier voor thuis meegeven

0 Check bij de ouders of ze weten wat ze moeten doen bij reacties thuis (contact gegevens – zie Patiënteninformatie)

0 Check bij de ouders dat ze weten dat ze het koemelkvrije dieet nog moeten houden

0 Voorlopige uitslag provocatie in status noteren

(Telefonische) Controle na 48 uur

Datum:

Naam arts/verpleegkundige:

Sinds provocatie klachten veranderd? Indien ja, specificeren.....

Neus/ogen 0 nee 0 ja, namelijk

Longen 0 nee 0 ja, namelijk

Huid 0 nee 0 ja, namelijk

Andere 0 nee 0 ja, namelijk

Wanneer zijn deze klachten opgetreden (hoeveel uren na provocatie)?
Medicatie veranderd sinds laatste provocatie? Indien ja, specificeren.

Objectivatie symptomen (bij optredende symptomen binnen 48 uur)

Datum:

Tijdstip:

Naam arts/verpleegkundige:

Neus/ogen	0 nee	0	ja, te weten
Longen	0 nee	0	ja, te weten
Huid	0 nee	0	ja, te weten
Andere	0 nee	0	ja te weten.....

0 Symptoomscoreformulier voor thuis opgeborgen in het dossier van de patiënt.

Conclusie provocatie dag

Provocatie is reglementair afgerond (tenminste 75% van de laatst gegeven dosis gedronken): 0 ja 0 nee

Indien ja:

- 0 Er is een objectieve reactie opgetreden
- 0 Er zijn herhaalde of persisterende subjectieve reactie opgetreden
- 0 Er zijn geen reacties opgetreden

Indien nee:

- 0 Het kind weigerde de voeding volledig te drinken
- 0 De provocatie is gestaakt op verzoek op de ouders
- 0 Anders, te weten

Beoordeling provocatie dag:

- 0 De provocatiedag is positief
- 0 De provocatie dag is negatief
- 0 De provocatie dag is dubieus of onbeslist

Toelichting:

Een provocatie is geslaagd als, bij het uitblijven van een reactie, tenminste t/m 75% van de laatste provocatiedosis is ingenomen.
Een provocatie is negatief of onbeslist bij milde objectieve of aanhoudende subjectieve klachten op de laatste provocatiedosis.

EINDBEOORDELING DUBBELBLINDE PLACEBOGECONTROLEERDE KOEMELK PROVOCATIE

- 0 Verbreek de code: 0 Provocatie dag 1 was verum / placebo
 0 Provocatie dag 2 was verum / placebo

Eindbeoordeling provocatie test

- 0 De provocatie dag met verum was: (positief, negatief of onbeslist)
0 De provocatie dag met placebo was:(positief, negatief of onbeslist)
0 Eindbeoordeling DBPGVP:(positief, negatief of onbeslist)

Toelichting

Verum	Placebo	Eindbeoordeling DBPGVP
Positief	Negatief	Positief
Negatief	Negatief	Negatief
Negatief (of positief, maar minder positief dan placebo)	Positief	Negatief
Positief	Positief	Negatief of onbeslist*

* Overleg met een gespecialiseerd centrum: Bij duidelijke verum reacties is de uitslag onbeslist en wordt de DBPCFC herhaald.

* Bij minder duidelijke of vertraagde verum reacties is de uitslag negatief of onbeslist. Herintroduceer koemelk of doe een verlengde DBPGVP.

Een provocatie is geslaagd als, bij het uitblijven van een reactie, ten minste t/m 75% van de laatste provocatiedosis is ingenomen.

FOLLOW-UP DUBBELBLINDE PLACEBOGECONTROLEERDE KOEMELK PROVOCATIE

Vervolg advies en te ondernemen acties:

- 0 Koemelkvrij dieet handhaven (bij positieve test)
- 0 Koemelk thuis introduceren volgens thuis introductieschema (bij negatieve test)

- 0 Klinisch introduceren (op indicatie, bij negatieve test)
- 0 DBPGVP herhalen

- 0 Informeer de huisarts, consultatiebureau arts, kinderarts en diëtiste

Acties

Verwijs zo nodig naar de diëtiste
Geef thuisintroductie schema voor koemelk mee
Maak telefonische afspraak voor over een maand
Maak afspraak
Maak afspraak of verwijs naar gespecialiseerde 2^e of 3^e lijn
Schrijf rapportage

Controle thuisintroductie

Controleer na een maand of melkproducten inderdaad zijn geïntroduceerd.

Wanneer de klachten opnieuw optreden kan de introductie worden gestaakt en na enige tijd weer worden hervat.

- 0 Introductie van melkproducten is probleemloos gegaan
- 0 Bij de introductie van melkproducten zijn er weer klachten opgetreden,
Namelijk

Vervolgens	0	zijn melkproducten opnieuw weggelaten
	0	is patiënt melkproducten blijven gebruiken
	0	zijn er opnieuw klachten opgetreden

Toelichting:

.....
.....

Als de klachten dan opnieuw optreden bij herhaalde inname wordt een **verlengde DBPGVP** uitgevoerd.

Hiervoor kan ook worden verwezen naar de gespecialiseerde 2^e of 3^e lijn omdat de interpretatie moeilijk kan (zie formulier verlengde DBPGVP)

EINDBEOORDELING VERLENGDE DUBBELBLINDE PLACEBO GECONTROLEERDE PROVOCATIE MET KOEMELK

- 0 Verbreek de code: 0 Provocatie week 1 was verum / placebo
 0 Provocatie week 2 was verum / placebo

Eindbeoordeling provocatie test

- 0 De provocatie dag met verum was: (positief, negatief of onbeslist)
0 De provocatie dag met placebo was:(positief, negatief of onbeslist)
0 Eindbeoordeling verlengde DBPGVP:(positief, negatief of onbeslist)

Verum	Placebo	Eindbeoordeling DBPGVP
Positief	Negatief	Positief
Negatief	Negatief	Negatief
Negatief (of positief, maar minder positief dan placebo)	Positief	Negatief
Positief	Positief	Negatief of onbeslist*

* Overleg met een gespecialiseerd centrum: Bij duidelijke verum reacties is de uitslag onbeslist en wordt de DBPCFC herhaald.

* Bij onduidelijke verum reacties op de laatste dosis is de uitslag negatief. Herintroduceer koemelk.

FOLLOW-UP VERLENGDE DUBBELBLINDE PLACEBOGECONTROLEERDE KOEMELK PROVOCATIE

Vervolg advies en te ondernemen acties:

- 0 Koemelkvrij dieet handhaven (bij positieve test)
- 0 Koemelk thuis introduceren

- 0 Informeer de huisarts, consultatiebureau arts, kinderarts en diëtiste

Acties

Verwijs zo nodig naar de diëtiste
Laat alle melkproducten gebruiken
Maak telefonische afspraak voor over een maand
Schrijf rapportage

Bijlage 14B. SYMPTOOMSCOREFORMULIER DUBBELBLINDE PLACEBOGECONTROLEERDEKOEMELK PROVOCATIE 1^E LIJN
(Voor zowel TEST DAG 1 en TEST DAG 2 wordt dit formulier ingevuld)

Betreft **0 TEST DAG 1**

0 TESTDAG 2

Naam kind:

Geboorte datum:

Testdatum:.....

Type testvoeding :

Voorbeeld registratie van symptomen

	Dosis 1 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 2 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 3 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 4 Tijd:	Reactie Tijd:
Tijdstip	8.00		8.30		09.00			
Symptomen								
Jeuk						09.20		

Symptoom registratie

	Dosis 1 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 2 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 3 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 4 Tijd:	Reactie Tijd:
Tijdstip								
Symptomen								

Symptomen kunnen zijn:**Huid:** Jeuk; roodheid; lokale urticaria; gegeneraliseerde urticaria; zwelling; overige**Gastro-intestinaal:** Angio-oedeem van de lippen, tong en gehemelte; jeuk in de mond; (krampende) buikpijn; misselijkheid; spugen (eenmalig); herhaald spugen; diarree, overige**Respiratoir:** Neusobstructie; niezen; conjunctivitis; loopneus; gevoel van zwelling keel; stridor/heesheid; hoesten; moeilijk slikken; benauwdheid; astma aanval; overige**Cardio-Vasculair:** Tachycardie; slap worden; hypotensie; verminderd bewustzijn; acute gedragsverandering; overige**Dosis herhaald?**

nee **ja, namelijk dosis:**
tijdstip:

Laatst gegeven testvoeding:Volledig gedronken: ja nee

Indien nee: hoeveel testvoeding gedronken:ml

Hoeveel testvoeding over:ml

Toelichting:

Samenvatting reacties op de testdag geen verschijnselen Verschijnselen optredend na dosis nr.: ...**Medicatie gegeven?** nee, ja, namelijk antihistaminicum per os/iv adrenaline**Lichamelijk onderzoek aan einde testdag**

Naam beoordelaar:

Algemene indruk:

Hals/Hoofd:

Longen:

Huid: (*vul TIS-score in*)

Te ondernemen acties:

- 0 Belafsprak met ouders voor over 48 uur
- 0 Symptoomscoreformulier voor thuis meegeven
- 0 Check bij de ouders of ze weten wat ze moeten doen bij reacties thuis (contact gegevens – zie Patiënteninformatie)
- 0 Check bij de ouders dat ze weten dat ze het koemelkvrije dieet nog moeten houden
- 0 Voorlopige uitslag provocatie in status noteren

(Telefonische) Controle na 48 uur

Datum:

Naam arts/verpleegkundige:

Sinds provocatie klachten veranderd? Indien ja, specificeren.....

Neus/ogen 0 nee 0 ja, namelijk

Longen 0 nee 0 ja, namelijk

Huid 0 nee 0 ja, namelijk

Andere 0 nee 0 ja, namelijk

Wanneer zijn deze klachten opgetreden (hoeveel uren na provocatie)?

Medicatie veranderd sinds laatste provocatie? Indien ja, specificeren.

Objectivatie symptomen (bij optredende symptomen binnen 48 uur)

Datum:

Tijdstip:

Naam arts/verpleegkundige:

Neus/ogen 0 nee 0 ja, te weten

Longen 0 nee 0 ja, te weten

Huid 0 nee 0 ja, te weten

Andere 0 nee 0 ja te weten.....

0 Symptoomscoreformulier voor thuis opgeborgen in het dossier van de patiënt.

Conclusie provocatie dag

Provocatie is reglementair afgerond (tenminste 75% van de laatst gegeven dosis gedronken): 0 ja 0 nee

Indien ja:

- 0 Er is een objectieve reactie opgetreden
- 0 Er zijn herhaalde of persisterende subjectieve reactie opgetreden
- 0 Er zijn geen reacties opgetreden

Indien nee:

- 0 Het kind weigerde de voeding volledig te drinken
- 0 De provocatie is gestaakt op verzoek op de ouders
- 0 Anders, te weten

Beoordeling provocatie dag:

- 0 De provocatiedag is positief
- 0 De provocatie dag is negatief
- 0 De provocatie dag is dubieus of onbeslist

Toelichting:

Een provocatie is geslaagd als, bij het uitblijven van een reactie, tenminste t/m 75% van de laatste provocatiedosis is ingenomen.
Een provocatie is negatief of onbeslist bij milde objectieve of aanhoudende subjectieve klachten op de laatste provocatiedosis.

EINDBEOORDELING DUBBELBLINDE PLACEBOGECONTROLEERDE KOEMELK PROVOCATIE

0 Verbreek de code: 0 Provocatie dag 1 was verum / placebo
0 Provocatie dag 2 was verum / placebo

Eindbeoordeling provocatie test

0 De provocatie dag met verum was: (positief, negatief of onbeslist)
0 De provocatie dag met placebo was:(positief, negatief of onbeslist)
0 Eindbeoordeling DBPGVP:(positief, negatief of onbeslist)

Toelichting

Verum	Placebo	Eindbeoordeling DBPGVP
Positief	Negatief	Positief
Negatief	Negatief	Negatief
Negatief (of positief, maar minder positief dan placebo)	Positief	Negatief
Positief	Positief	Negatief of onbeslist*

* Overleg met een gespecialiseerd centrum: Bij duidelijke verum reacties is de uitslag onbeslist en wordt de DBPCFC in de 2^e of 3^e lijn herhaald.

* Bij minder duidelijke of vertraagde verum reacties is de uitslag negatief of onbeslist. Herintroduceer koemelk of verwijst naar de (gespecialiseerde) 2^e of 3^e lijn voor een verlengde DBPGVP.

Een provocatie is geslaagd als, bij het uitblijven van een reactie, ten minste t/m 75% van de laatste provocatiedosis is ingenomen.

FOLLOW-UP DUBBELBLINDE PLACEBOGECONTROLEERDE KOEMELK PROVOCATIE

Vervolg advies en te ondernemen acties:

- 0 Koemelkvrij dieet handhaven (bij positieve test)
- 0 Koemelk thuis introduceren volgens thuis introductieschema (bij negatieve test)

- 0 Klinisch introduceren (op indicatie, bij negatieve test)
- 0 Bij onbesliste test
- 0 Informeer de huisarts, consultatiebureau arts, kinderarts en diëtiste

Acties

Verwijs zo nodig naar de diëtiste
Geef thuisintroductie schema voor koemelk mee
Maak telefonische afspraak voor over een maand
Maak afspraak
Verwijs naar (gespecialiseerde) 2^e of 3^e lijn
Schrijf rapportage

Controle thuisintroductie

Controleer na een maand of melkproducten inderdaad zijn geïntroduceerd.

Wanneer de klachten opnieuw optreden kan de introductie worden gestaakt en na enige tijd weer worden hervat.

- 0 Introductie van melkproducten is probleemloos gegaan
- 0 Bij de introductie van melkproducten zijn er weer klachten opgetreden,
Namelijk

- Vervolgens 0 zijn melkproducten opnieuw weggelaten
- 0 is patiënt melkproducten blijven gebruiken
- 0 zijn er opnieuw klachten opgetreden

Toelichting:

.....

Als de klachten dan opnieuw optreden wordt verwezen naar de (gespecialiseerde) 2^e of 3^e lijn voor een **verlengde DBPGVP**.

Bijlage 15A. SYMPTOOMSCOREFORMULIER OPEN KOEMELK PROVOCATIE 2^E EN 3^E LIJN

Naam kind:

Geboorte datum:

Testdatum:.....

0 Type testvoeding :

0 Infuus hoeft niet ingebracht

0 Infuus ingebracht

Voorbeeld registratie van symptomen

	Dosis 1 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 2 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 3 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 4 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 5 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 6 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 7 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 8 Tijd:	Reactie Tijd:
Tijdstip	8.00		8.30		09.00											
Symptomen																
Jeuk						09.20										

	Dosis 1 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 2 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 3 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 4 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 5 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 6 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 7 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 8 Tijd:	Reactie Tijd:
Tijdstip																
Symptomen																
Jeuk																
Roodheid																
Lokale urticaria																
Gegenerali- seerde urtica- ria																
Zwelling																
Overig																
Gastro- intestinaal																
Angio-oedeem van de lippen, tong en gehe- melte																
Jeuk in de mond																
(Krampende) buikpijn																
Misselijkheid																
Spugen (een- malig)																

	Dosis 1 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 2 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 3 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 4 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 5 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 6 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 7 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 8 Tijd:	Reactie Tijd:
Herhaald spu- gen																
Diarree																
Overig																
Respiratoir																
Neusobstructie																
Niezen																
Conjunctivitis																
Loopneus																
Gevoel van zwellings keel																
Stridor/ Hees- heid																
Hoesten																
Moeilijk slikken																
Benauwdheid																
Astma aanval																
Overige																
Cardio- Vasculair																

Medicatie gegeven? 0 nee, 0 ja, namelijk

0 antihistaminicum per os/iv
0 luchtwegverwijders
0 adrenaline
0 anders, nl.:

Lichamelijk onderzoek aan einde testdag

Algemene indruk:

Hals/Hoofd:

Longen:

Huid: (*vul TIS-score in*)

Bloeddruk:

Hartfrequentie:

Temperatuur°C

Piekstrooml/min

Saturatie (O₂)%

Overig:

Naam beoordelaar:

Te ondernemen acties:

- 0 Belafsprak met ouders voor over 48 uur
- 0 Symptoomscoreformulier voor thuis meegeven
- 0 Check bij de ouders of ze weten wat ze moeten doen bij reacties thuis (contact gegevens – zie Patiënteninformatie)
- 0 Check bij de ouders dat ze weten dat ze het koemelkvrije dieet nog moeten houden
- 0 Voorlopige uitslag provocatie in status noteren

(Telefonische) Controle na 48 uur

Datum:

Naam arts/verpleegkundige:

Sinds provocatie klachten veranderd? Indien ja, specificeren.....

Neus/ogen 0 nee 0 ja, namelijk

Longen 0 nee 0 ja, namelijk

Huid 0 nee 0 ja, namelijk

Andere 0 nee 0 ja, namelijk

Wanneer zijn deze klachten opgetreden (hoeveel uren na provocatie)?
Medicatie veranderd sinds laatste provocatie? Indien ja, specificeren.

Objectivatie symptomen (bij optredende symptomen binnen 48 uur)

Datum:

Tijdstip:

Naam arts/verpleegkundige:

Neus/ogen	0 nee	0	ja, te weten
Longen	0 nee	0	ja, te weten
Huid	0 nee	0	ja, te weten
Andere	0 nee	0	ja te weten.....

0 Symptoomscoreformulier voor thuis opgeborgen in het dossier van de patiënt.

Conclusie provocatie

Provocatie is reglementair afgerond (tenminste 75% van de laatst gegeven dosis gedronken): 0 ja 0 nee

Indien ja:

- 0 Er is een objectieve reactie opgetreden
- 0 Er zijn herhaalde of persisterende subjectieve reactie opgetreden
- 0 Er zijn geen reacties opgetreden

Indien nee:

- 0 Het kind weigerde de voeding volledig te drinken
- 0 De provocatie is gestaakt op verzoek op de ouders
- 0 Anders, te weten

Beoordeling provocatie dag en follow-up:

- 0 De Open provocatie is positief
- 0 De Open provocatie is negatief

Te ondernemen acties

- 0 (Verwijs naar 2^e of 3^e lijn voor) DBPGVP
Verwijs zo nodig naar de diëtiste
- 0 Geef thuisinstructie schema voor koemelk mee
- 0 Maak telefonische afspraak voor over een maand

- | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | De Open provocatie is dubieus of onbeslist | 0 | Op indicatie: introduceer koemelk klinisch |
| 0 | Informeer de huisarts, consultatiebureau arts, kinderarts en diëtiste | 0 | (Verwijs naar gespecialiseerde 2 ^e of 3 ^e lijn voor) DBPGVP |
| | | 0 | Schrijf rapportage |

Toelichting:

Een provocatie is negatief of onbeslist bij milde objectieve of aanhoudende subjectieve klachten op de laatste provocatiedosis. Herintroduceer koemelk in het dieet of overleg met een collega over de uitslag van de test.

Controle thuisintroductie

Controleer na een maand of melkproducten inderdaad zijn geïntroduceerd.

Wanneer de klachten opnieuw optreden kan de introductie worden gestaakt en na enige tijd weer worden hervat.

- 0 Introductie van melkproducten is probleemloos gegaan
- 0 Bij de introductie van melkproducten zijn er weer klachten opgetreden, Namelijk

- | | | |
|------------|---|--------------------------------------------|
| Vervolgens | 0 | zijn melkproducten opnieuw weggelaten |
| | 0 | is patiënt melkproducten blijven gebruiken |
| | 0 | zijn er opnieuw klachten opgetreden |

Toelichting:

.....

.....

Als de klachten dan opnieuw optreden bij herhaalde inname wordt een **verlengde DBPGVP** uitgevoerd.

Hiervoor kan ook worden verwezen naar de gespecialiseerde 2^e of 3^e lijn omdat de interpretatie moeilijk kan (zie formulier verlengde DBPGVP – bijlage 14A)

Bijlage 15B.

SYMPTOOMSCOREFORMULIER OPEN KOEMELK PROVOCATIE 1^e lijn

Naam kind:

Geboorte datum:

Testdatum:.....

Type testvoeding :

Voorbeeld registratie van symptomen

	Dosis 1 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 2 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 3 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 4 Tijd:	Reactie Tijd:
Tijdstip	8.00		8.30		09.00			
Symptomen								
Jeuk						09.20		

Symptoom registratie

	Dosis 1 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 2 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 3 Tijd:	Reactie Tijd:	Dosis 4 Tijd:	Reactie Tijd:
Tijdstip								
Symptomen								

Te ondernemen acties:

- 0 Belafpraak met ouders voor over 48 uur
- 0 Symptoomscoreformulier voor thuis meegeven
- 0 Check bij de ouders of ze weten wat ze moeten doen bij reacties thuis (contact gegevens – zie Patiënteninformatie)
- 0 Check bij de ouders dat ze weten dat ze het koemelkvrije dieet nog moeten houden
- 0 Voorlopige uitslag provocatie in status noteren

(Telefonische) Controle na 48 uur

Datum:

Naam arts/verpleegkundige:

Sinds provocatie klachten veranderd? Indien ja, specificeren.....

Neus/ogen 0 nee 0 ja, namelijk

Longen 0 nee 0 ja, namelijk

Huid 0 nee 0 ja, namelijk

Andere 0 nee 0 ja, namelijk

Wanneer zijn deze klachten opgetreden (hoeveel uren na provocatie)?

Medicatie veranderd sinds laatste provocatie? Indien ja, specificeren.

Objectivatie symptomen (bij optredende symptomen binnen 48 uur)

Datum:

Tijdstip:

Naam arts/verpleegkundige:

Neus/ogen 0 nee 0 ja, te weten

Longen 0 nee 0 ja, te weten

Huid 0 nee 0 ja, te weten

Andere 0 nee 0 ja te weten.....

0 Symptoomscoreformulier voor thuis opgeborgen in het dossier van de patiënt.

Conclusie provocatie

Provocatie is reglementair afgerond (tenminste 75% van de laatst gegeven dosis gedronken): 0 ja 0 nee

Indien ja:

- 0 Er is een objectieve reactie opgetreden
- 0 Er zijn herhaalde of persisterende subjectieve reactie opgetreden
- 0 Er zijn geen reacties opgetreden

Indien nee:

- 0 Het kind weigerde de voeding volledig te drinken
- 0 De provocatie is gestaakt op verzoek op de ouders
- 0 Anders, te weten

Beoordeling provocatie dag en follow-up:

- 0 De Open provocatie is positief
- 0 De Open provocatie is negatief
- 0 De Open provocatie is dubieus of onbeslist
- 0 Informeer de huisarts, consultatiebureau arts, kinderarts en diëtiste

Te ondernemen acties

- 0 (Verwijs naar 2^e of 3^e lijn voor) DBPGVP
Verwijs zo nodig naar de diëtiste
- 0 Geef thuisintroductie schema voor koemelk mee
- 0 Maak telefonische afspraak voor over een maand
- 0 Op indicatie: introduceer koemelk klinisch
- 0 Verwijs naar gespecialiseerde 2^e of 3^e lijn voor DBPGVP
- 0 Schrijf rapportage

Toelichting:

Een provocatie is negatief of onbeslist bij milde objectieve of aanhoudende subjectieve klachten op de laatste provocatiedosis. Herintroduceer koemelk in het dieet of overleg met een collega over de uitslag van de test.

Controle thuisintroductie

Controleer na een maand of melkproducten inderdaad zijn geïntroduceerd.

Wanneer de klachten opnieuw optreden kan de introductie worden gestaakt en na enige tijd weer worden hervat.

- 0 Introductie van melkproducten is probleemloos gegaan
- 0 Bij de introductie van melkproducten zijn er weer klachten opgetreden,
Namelijk

- Vervolgens 0 zijn melkproducten opnieuw weggelaten
- 0 is patiënt melkproducten blijven gebruiken
- 0 zijn er opnieuw klachten opgetreden

Toelichting:

.....

.....

Als de klachten dan opnieuw optreden bij herhaalde inname wordt een **verlengde DBPGVP** uitgevoerd.
Hiervoor wordt verwezen naar de gespecialiseerde 2^e of 3^e lijn omdat de interpretatie moeilijk kan (zie formulier verlengde DBPGVP – bijlage 14A)