

Appendix I

Voorbeeld: Overzicht met aanvullende diagnostiek op basis van BSR-richtlijn.

Onderdeel	Eerste beoordeling	Beoordeling (actieve ziekte) Patiënten met actieve ziekte zouden ten minste elke 1-3 maanden beoordeeld moeten worden	Monitoring (stabiele ziekte) Patiënten met stabiele/lage ziekteactiviteit zouden elke 6-12 maanden gemonitord moeten worden
Anamnese en lichamelijk onderzoek			
Gedetailleerde anamnese	X	Specifieke anamnese	Specifieke anamnese
Lichamelijk onderzoek	X	X	X ^a
Vitale functies (bloeddruk, hartslag, gewicht)	X	X	X ^a
Medicatieoverzicht inclusief	X	X ^a	X ^a
Vaccinatie status	X	X ^a	X ^a
Bloed			
Volledig bloedbeeld	X	X	X
Overige testen voor anemie	X ^a	X ^a	X ^a
Renale functie	X	X	X
Transaminases	X	X	X
Creatine kinase	X	X ^a	X ^a
CRP en BSE	X	X	X
Vitamine D	X	X ^a	X ^a
Schildklier functie	X	X ^a	X ^a
Immunologie			
ANA	X	-	-
Anti-dsDNA *	X	X ^a	X ^a
C3/C4 complement *	X	X ^a	X ^a
LAC, aCL, anti-B2GP-1 **	X	X ^a	X ^a
Anti-Ro/La, anti-RNP en anti-Sm antistoffen	X	-	-
Anti-C1q antistoffen	X ^a	X ^a	X ^a
Immunoglobulines	X	X ^a	X ^a
Direct Coombs' test	X	X ^a	X ^a
Urine			
Urinesediment	X	X ^a	X ^a
24-uur urine of de eiwit/creatinine ratio	X	X ^a	X ^a
Urinekweek	X ^a	X ^a	X ^a
Urinemicroscopie (en kweek)	X ^a	X ^a	X ^a
Overig			
ECG	X	X ^a	X ^a
Beeldvorming			
Thorax röntgenfoto	X	X ^a	X ^a
Factoren cardiovasculair risico			
Hypertensie	X	X ^a	Elke 12 maanden
Dyslipidaemie	X	X ^a	Elke 12 maanden
Diabetes Mellitus	X	X ^a	Elke 12 maanden
BMI	X	X ^a	Elke 12 maanden
Roken	X	X ^a	Elke 12 maanden
Onvoldoende lichaamsbeweging ^b			
aCL: anticardiolipine; LAC: lupus anticoagulans; anti-B2GP-1: anti-B2-glycoproteïne 1.			
^a Op indicatie			
^b Nederlandse Norm Gezond bewegen			
* Gelijktijdig monitoren anti-dsDNA en C3/C4 complement geadviseerd			
** Indien positief herhalen na 12 weken			