

## **Levertransplantatie galwegcarcinoom**

De werkgroep adviseert om contact op te nemen met een van de drie levertransplantatiecentra indien een patiënt met een galwegcarcinoom mogelijk in aanmerking komt voor levertransplantatie.

### **Literatuurbespreking:**

Tot voor kort was het galwegcarcinoom een absolute contra-indicatie voor levertransplantatie. Recent zijn bij geselecteerde groepen patiënten, na zeer intensieve behandeling met chemoradiotherapie, 5-jaars overlevingspercentages tot 73% gerapporteerd [116](#) [130](#). Andere studies, met eveneens strenge selectiecriteria maar zonder intensieve neo-adjuvante behandeling, hebben 5-jaarsoverleving tot 58% laten zien [36](#) [115](#). Deze resultaten hebben in Nederland geleid tot de ontwikkeling van het protocol 'Indicatiestelling en selectie voor levertransplantatie bij patiënten met perihilair galwegcarcinoom' door het Landelijk Overleg Levertransplantatie (LOL).

Het LOL is te raadplegen via de Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV) of via een van de drie levertransplantatiecentra in Nederland. Volgens het protocol kunnen streng geselecteerde patiënten met een galwegcarcinoom in aanmerking komen voor een levertransplantatie zonder neo-adjuvante therapie. De belangrijkste selectiecriteria zijn:

- Chirurgische resectie van het galwegcarcinoom is anatomisch of functioneel niet mogelijk
- Geen eerdere percutane tumorbiopsie, percutane galwegdrainage en/of chirurgische exploratie van de galwegen waarbij contact is geweest met het tumorgebied
- Geen tumor groter dan 3 cm zichtbaar op CT of MRI en geen aanwijzingen voor doorgroei van tumor in de distale galweg in de pancreaskop
- Geen aanwijzingen voor peritoneaal-, lymfklier- en/of ander metastase.

**Conclusies:**

Er zijn aanwijzingen dat bij een zeer geselecteerde groep patiënten (zie [literatuurbespreking](#)) met een galwegcarcinoom levertransplantatie zinvol is.

Friman 2011 [36](#); Robles 2004 [115](#)

**Overwegingen:**

Levertransplantatie voor galwegcarcinoom is een experimentele behandeling, waar een geselecteerde groep patiënten voor in aanmerking komt.