

Disclaimer

In aanvulling op de gebruikersvoorwaarden, die in deze onverkort van toepassing zijn, geldt hetgeen hierna staat. Deze richtlijn is eerder geplaatst geweest op Oncoline en is vooruitlopend op het modulair actualiseren ervan, nu in deze database opgenomen. De richtlijn zoals die nu is opgenomen voldoet nog niet geheel aan alle kwaliteitseisen die aan publicatie in de Richtlijnen-database worden gesteld en daarom is deze tekst als PDF geplaatst. De richtlijn is inmiddels zoals u zult bemerken deels modulair geactualiseerd in onderhoudsronden.

Woord van aanbeveling

De richtlijnen gynaecologische tumoren zijn gemaakt binnen de Commissie Richtlijnen Gynaecologische Oncologie (CRGO). Dit is een multidisciplinair samengestelde commissie, waarvan de leden uit alle IK-regio's afkomstig zijn. Er is gewerkt op basis van consensus. De meest recente literatuur is gehanteerd. De richtlijnen zijn in alle regio's besproken. De richtlijnen hebben een adviserend karakter. De CRGO zal de teksten van de richtlijnen zonedig jaarlijks aanpassen.

Premaligniteiten van de vulva

Bij de herziening van de richtlijn (modulair) werd er een algemene zoekstrategie verricht voor de basisonderwerpen zoals diagnostiek en behandeling. Hiermee werden geen nieuwe inzichten gevonden. De lijst met gebruikte zoektermen staat in bijlage vermeld.

Naast deze algemene zoekstrategieën werden er uitgangsvragen geformuleerd die uitgewerkt en beschreven zijn in onderstaande hoofdstukken van de richtlijn: zie voor de modules op de richtlijnen-database.nl.

PREVENTIE

Vaccinatie

Het adequaat behandelen van de lichen sclerosus heeft als doel de preventie van het ontstaan van dVIN en vulvacarcinoom. Een laagfrequente onderhoudsdosering van corticosteroïden ook bij rustige lichen sclerosus is hier een belangrijk onderdeel van.

Voor verdere info verwijst de werkgroep naar de Richtlijn Lichen Sclerosus.[Lee et al.2015]

Referentie

Lee A, Bradford J, Fischer G 2015 Long-term Management of Adult Vulvar Lichen Sclerosus: A Prospective Cohort Study of 507 Women. JAMA Dermatol. ;151(10):1061-7.

BIJLAGEN

Zoekstrategie

"Squamous Intraepithelial Lesions of the Cervix"[Mesh] OR "Bowen's Disease"[Mesh] OR "Carcinoma in situ"[Mesh] OR "Precancerous conditions"[Mesh] OR "Carcinoma in Situ"[tiab] OR "SIL"[Tiab] OR "Bowen"[tiab] OR "HSIL"[Tiab] OR "VIN"[Tiab] OR "intraepithelial neoplasia"[tiab] OR Premalignant lesion*[tiab] OR "intraepithelial carcinoma*"[tiab] OR "Bowenoid Papulosis"[tiab] OR "Squamous Intraepithelial Lesion*"[tiab] OR "High-grade squamous intraepithelial lesion*"[tiab] OR "Precancerous conditions"[tiab] 101381

AND "Vulva"[Mesh] OR Vulva*[tiab] 20511

Combinatie: Premaligne afwijkingen van de vulva: 2029

Limiet 2009-2019 627

Limiet 2014-2019 306