

Tabel 2. NICE stoplichtentabel – gemodificeerd naar voorbeeld van NICE

	Groen – laag risico	Oranje – matig risico	Rood – hoog risico
Kleur	<ul style="list-style-type: none"> • Normale kleur van de huid, lippen en tong 	<ul style="list-style-type: none"> • Door ouders gerapporteerde bleekheid 	<ul style="list-style-type: none"> • (Lijk)bleek/vlekkenvlekkerig/ge marmerd
Activiteit	<ul style="list-style-type: none"> • Reageert normaal op sociale prikkels • Tevreden/lachen • Blijft alert of wordt snel alert • Op een krachtige en gebruikelijke wijze huilen/ niet huilen 	<ul style="list-style-type: none"> • Reageert niet normaal op sociale prikkels • Wordt alleen alert na stimulering • Verminderde activiteit • Niet lachen • Ziekte volgens ouders anders dan eerdere ziekte-episoden • Maakt zieke indruk volgens de zorgverlener 	<ul style="list-style-type: none"> • Reageert niet op sociale prikkels • Wordt niet alert of blijft niet alert na stimulering • Zwak, op hoge toon of continu huilen
Respiratoir		<ul style="list-style-type: none"> • Neusvleugelen • Tachypneu: <ul style="list-style-type: none"> • AH > 50/min, 6 – 12 maanden ➢ 40 /min, > 12 maanden • Zuurstofsaturatie ≤ 95% bij kamerlucht • Crepitaties bij auscultatie 	<ul style="list-style-type: none"> • Kreunen • Tachypneu: AH > 60 /min • Matig of ernstig intrekkingen van de ademhalingspijpen
Circulatie en Hydratiestatus	<ul style="list-style-type: none"> • Normale huid en ogen • Vochtige slijmvliezen 	<ul style="list-style-type: none"> • Tachycardie: <ul style="list-style-type: none"> • HF > 160 /min, ≤ 1 jaar ➢ 150/min, 1 – 2 jaar ➢ 140/min, 2 – 5 jaar • Droge slijmvliezen • Verminderde voedingsinname door zuigelingen • Verminderde urineproductie • Capillaire refill-tijd ≥ 3 seconden 	<ul style="list-style-type: none"> • Verminderde turgor van de huid
Anders	<ul style="list-style-type: none"> • Geen oranje of rode symptomen 	<ul style="list-style-type: none"> • Zwelling van een gewricht of ledemaat • Geen gewicht kunnen dragen of niet gebruiken van een ledemaat • Leeftijd < 6 maanden, koorts ≥ 39 graden • Koorts ≥ 5 dagen • Koude rillingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Petchiën • Bomberende fontanel • Nekstijfheid • Status epilepticus • Focale neurologische tekenen • Focale convulsies • Leeftijd < 1 maand met koorts zonder focus

AH, ademhaling; HF, hartslagfrequentie

* oranje: LR+ 1,00 – 5,00, rood: LR+ >5,0