

Tabel 3. Samenvatting van symptomen van specifieke aandoeningen

Te overwegen diagnose	Symptomen en tekenen samen met koorts
Meningococcenziekte	Petechiën, al dan niet in combinatie met: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zieke indruk</li> <li>• Purpura met een diameter &gt; 2mm</li> <li>• Vertraagde capillaire refill-tijd van <math>\geq 3</math> seconden</li> <li>• Nekstijfheid</li> </ul> Vroege symptomen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kouden handen/voeten</li> <li>• Pijn in benen</li> <li>• Bleke huid</li> </ul>
Meningitis	Nekstijfheid Bomberende fontanel Verminderd bewustzijn Status epilepticus
Herpes simplex encephalitis	Focale neurologische afwijkingen Focale convulsies Verminderd bewustzijn
Pneumonie	Tachypneu (ademhalingsfrequentie > 60/min, leeftijd 0–5 maanden; 50/min, leeftijd 6 – 12 maanden; > 40 /min, leeftijd > 12 maanden) of leeftijdsspecifieke afkapwaarden Crepitaties bij auscultatie Neusvleugelen Intrekkingen van de borstkas Cyanose Zuurstofsaturatie $\leq 95\%$
Urineweginfectie	Braken Verminderde voedingsinname Lethargie Prikkelbaar Buikpijn Dysurie Hematurie
Septische arthritis	Zwelling van ledemaat of gewricht Niet gebruiken van een extremiteit Geen gewicht kunnen dragen op een gewricht
Kawasaki	Aanhoudende hoge koorts > 5 dagen en tenminste vier van de volgende kenmerken: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilaterale conjunctivale injectie</li> <li>• Aangedane slijmvliezen</li> <li>• Afwijkingen aan extremiteiten</li> <li>• Polymorfe rash</li> <li>• Cervicale lymfadenopathie</li> </ul>
Toxic shock syndroom (staphylokok/ streptokok)	Hoge koorts >39°C, rillingen, braken/diarree, hoofdpijn, keelpijn, diffus erythematuze rash, aardbeientong, conjunctivitis, hypotensie, somnolentie Vervellingen 1-2 weken na start ziektebeeld