

Bijlage Overzicht audiologische zorg

Audiologische zorg 0-4 jarigen					
zorgpadfase	onderdelen zorg	brede vraag		deelvraag/aspect	module/verwijzing/kennishiaat
Audiologische diagnostiek	Audiologische diagnostiek na verwijzing bij leeftijd 0-9 maanden	Welke audiologische diagnostiek moet uitgevoerd worden?	Alle verliezen	Met welke ABR-methode moet de gehoordrempel bepaald worden?	Deze richtlijn: Module Diagnostiek 0 tot 9 maanden
				Hoe moet tympanometrie uitgevoerd worden?	Zie www.audiologieboek.nl
				Hoe moeten OAE metingen uitgevoerd worden?	Zie www.audiologieboek.nl
	Audiologische diagnostiek na verwijzing of controle vanaf 9 maanden	Welke subjectieve diagnostiek moet uitgevoerd worden?	Alle verliezen	Hoe moet VRA/BOA uitgevoerd worden?	Zie www.audiologieboek.nl
				Hoe moet spelaudiometrie uitgevoerd worden?	Zie www.audiologieboek.nl
				Hoe moet spraakaudiometrie uitgevoerd worden	Zie www.audiologieboek.nl
				Hoe moet tympanometrie uitgevoerd worden?	Zie www.audiologieboek.nl
				Hoe moeten OAE-metingen uitgevoerd worden?	Zie www.audiologieboek.nl

Indicatie audiologische zorg en aanpalende zorg	Indicatie voor starten audiologische zorg	Bij welk gehoorverlies is er indicatie voor audiologische zorg?	Alle verliezen	Vanaf welk gehoorverlies moet audiologische zorg (monitoring, technische revalidatie, begeleiding) aangeboden worden bij een tweezijdig verlies	Deze richtlijn: Module Indicatie audiologische zorg bij lichte verliezen
				Welke audiologische zorg (monitoring, technische revalidatie, begeleiding) is geïndiceerd bij kinderen van 0-4 jaar met een unilateraal gehoorverlies?	Deze richtlijn: Module Audiologische zorg bij unilaterale verliezen
	Indicatie voor medische diagnostiek	Wanneer is er een indicatie voor medische diagnostiek naar de oorzaak van het gehoorverlies?	Alle verliezen	Wanneer is er een indicatie voor medische diagnostiek naar de oorzaak van het gehoorverlies en hoe wordt dit uitgevoerd	Richtlijn slechthorendheid op de kinderleeftijd (etiologische richtlijn) (*)
	Indicatie voor vroegbehandeling	Wanneer is er een indicatie voor vroegbehandeling?	Alle verliezen	Wanneer wordt er verwezen naar vroegbehandeling?	Deze richtlijn: Module Begeleiden van ouders
Audiologische zorg	Realiseren hoorbaarheid: met hoortoestellen	Hoe dient hoorbaarheid gerealiseerd te worden bij slechthorende kinderen van 0-4 jaar middels hoortoestellen?	Alle verliezen	Bij welk gehoorverlies zijn hoortoestellen geïndiceerd voor het realiseren van voldoende hoorbaarheid?	Deze richtlijn: Module Realiseren hoorbaarheid
				Welke hoortoestellen en welke features moeten gekozen worden voor het realiseren van voldoende hoorbaarheid?	Kennislacune voor deze leeftijdsgroep, raadpleeg eventueel de richtlijn audiologische zorg voor

					slechthorende kinderen van 4-18 jaar
				Hoe moeten de hoortoestellen ingesteld en geverifieerd worden voor het realiseren van voldoende hoorbaarheid?	Deze richtlijn: Module Realiseren hoorbaarheid
Realiseren hoorbaarheid: met BCD			Conductief verlies	bij welk gehoorverlies (aard, omvang) is een BCD geïndiceerd?	Zie richtlijn BCD, module indicatiestelling
				welke BCD moet gekozen worden en hoe moet deze worden ingesteld?	Zie richtlijn BCD: BCD klasse bij type gehoorverlies/toepassing
Realiseren hoorbaarheid: met CI	Bij welk gehoorverlies (aard, omvang) en overige criteria is het starten van een CI adviestraject geïndiceerd?	Ernstig en zeer ernstig verlies /auditieve neuropathie		bij welk gehoorverlies (aard, omvang) en overige criteria is het starten van een CI adviestraject geïndiceerd?	zie veldnorm Cochleaire Implantatie (CI-ON)
Realiseren hoorbaarheid: met solo apparatuur	Hoe kan hoorbaarheid/verstaan in rumoer en op afstand gerealiseerd worden met solo apparatuur bij slechthorende kinderen van 0-4 jaar		Alle verliezen	wat zijn de indicaties voor solo apparatuur?	Kennislacune voor deze leeftijdsgroep, raadpleeg eventueel de richtlijn audiologische zorg voor slechthorende kinderen van 4-18 jaar
				hoe moet solo apparatuur ingesteld worden (eventueel in combinatie met andere hoorhulpmiddelen)	Kennislacune voor deze leeftijdsgroep, raadpleeg eventueel de richtlijn audiologische zorg voor

					slechthorende kinderen van 4-18 jaar
	Optimaliseren draagduur	Hoe kan de draagduur van hoorapparatuur worden geoptimaliseerd?	Alle verliezen	Hoe kan de draagduur van hoorapparatuur worden geoptimaliseerd?	Deze richtlijn: Module Strategieën optimale draagduur
Monitoring	Gehoor	Hoe moet herhaaldiagnostiek van het gehoor uitgevoerd worden (met en zonder hoorapparatuur)	Alle verliezen	Hoe moet herhaaldiagnostiek van het gehoor uitgevoerd worden (met en zonder hoorapparatuur)	Zie www.audiologieboek.nl
	Ontwikkelingsaspecten	Wanneer en hoe moet de spraaktaalontwikkeling gemonitord worden?	Alle verliezen	Welke ontwikkelingsmaten moeten gemonitord worden tav de spraaktaal en communicatieve ontwikkeling?	Deze richtlijn: Module Monitoring van algehele en spraaktaalontwikkeling
		Wanneer en hoe moet de sociaal-emotionele gemonitord worden?	Alle verliezen	Welke ontwikkelingsmaten moeten gemonitord worden tav de sociaal-emotionele ontwikkeling?	Deze richtlijn: Module Monitoring van algehele en spraaktaalontwikkeling
		Wanneer en hoe moet de nonverbale cognitieve ontwikkeling gemonitord worden?	Alle verliezen	Welke ontwikkelingsmaten moeten gemonitord worden tav de nonverbale cognitieve ontwikkeling?	Deze richtlijn: Module Monitoring van algehele en spraaktaalontwikkeling
		Wanneer en hoe moet de auditieve ontwikkeling gemonitord worden?	Alle verliezen	Welke ontwikkelingsmaten moeten gemonitord worden tav de auditieve ontwikkeling?	Deze richtlijn: Module Monitoring van auditieve ontwikkeling

Informatie	Over slechthorendheid	Hoe informeer je ouders over de diagnose en mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling?	Alle verliezen	Op welke wijze en welke informatie moet in ieder geval aan ouders/ opvoeders verstrekt worden om hen de keuze te kunnen laten maken voor een optimaal hoorrevalidatietraject.	Deze richtlijn: Module Begeleiden van ouders
Organisatie van zorg	Tijdigheid	Hoe moet het tijdspad van de behandeling zijn?	Alle verliezen	Wat moet het tijdspad van de behandeling zijn? Hoe moet het tijdspad van neonatale diagnostiek en zo nodig audiologische zorg eruitzien om het risico op achterstanden in spraak-taal en algehele ontwikkeling te beperken?	Deze richtlijn: Module Tijdspad neonatale diagnostiek en interventie
	Wat doet het AC?	Hoe is de audiologische zorg in de AC's georganiseerd en aan welke eisen moet daarbij voldaan zijn?	Alle verliezen	Hoe is de audiologische zorg in de AC's georganiseerd en aan welke eisen moet daarbij voldaan zijn?	Deze richtlijn: Module Organisatie van zorg
	Hoe worden logopedische en psychosociale zorg georganiseerd?	Hoe organiseert het AC logopedische en psychosociale zorg binnen de organisatie of binnen de zorgketen?	Alle verliezen	hoe organiseert het AC logopedische en psychosociale zorg binnen de organisatie of binnen de zorgketen?	Deze richtlijn: Module Organisatie van zorg En deze richtlijn: Module Begeleiden van ouders

(*) de inhoud van de module [Audiologisch onderzoek naar slechthorendheid](#) valt feitelijk buiten de scope van de etiologische richtlijn en binnen de scope van de huidige richtlijn audiologische zorg voor slechthorende kinderen van 0-4 jaar