

Tabel 1. Trend in incidentie en sterfte van invasief schildkliercarcinoom in Nederland, 1989-2011

	Periode																							
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Incidentie																								
totaal	2,01	2,12	1,88	1,92	2,05	1,96	2,14	1,87	2,09	2,04	2,12	2,09	2,03	2,20	2,20	2,40	2,61	2,44	2,55	2,77	2,95	3,04	3,25	
mannen	0,95	1,38	1,24	1,12	1,33	1,37	1,41	1,25	1,27	1,16	1,36	1,30	1,40	1,28	1,14	1,62	2,01	1,30	1,43	1,67	1,71	1,74	1,98	
vrouwen	3,07	2,86	2,52	2,72	2,76	2,55	2,87	2,49	2,91	2,91	2,88	2,88	2,66	3,13	3,27	3,18	3,21	3,59	3,67	3,86	4,20	4,33	4,52	
totaal papillair	1,02	1,14	0,90	1,00	1,02	1,01	1,13	0,99	1,22	1,18	1,22	1,29	1,26	1,37	1,37	1,55	1,67	1,72	1,72	1,81	2,12	2,17	2,18	
totaal folliculair	0,43	0,51	0,52	0,51	0,47	0,47	0,43	0,37	0,43	0,46	0,40	0,43	0,36	0,44	0,43	0,41	0,53	0,33	0,42	0,52	0,38	0,43	0,53	
totaal slecht gediff ca	0,08	0,11	0,07	0,10	0,09	0,08	0,07	0,11	0,13	0,07	0,13	0,08	0,08	0,07	0,07	0,12	0,07	0,09	0,07	0,06	0,11	0,07	0,07	
totaal ongediff (anapl) ca	0,17	0,14	0,19	0,10	0,13	0,16	0,14	0,15	0,10	0,16	0,19	0,08	0,14	0,13	0,11	0,14	0,10	0,13	0,10	0,14	0,11	0,12	0,13	
totaal medullair	0,20	0,16	0,12	0,16	0,26	0,21	0,31	0,21	0,19	0,14	0,16	0,18	0,14	0,14	0,14	0,16	0,17	0,15	0,22	0,17	0,16	0,21	0,22	
totaal overig	0,11	0,05	0,08	0,03	0,08	0,04	0,07	0,03	0,03	0,04	0,01	0,03	0,04	0,07	0,09	0,03	0,07	0,03	0,03	0,07	0,06	0,04	0,11	
mannen papillair	0,45	0,73	0,54	0,46	0,55	0,56	0,64	0,59	0,71	0,60	0,65	0,79	0,78	0,66	0,66	0,93	1,20	0,83	0,82	1,01	1,16	1,08	1,25	
mannen folliculair	0,17	0,30	0,32	0,33	0,27	0,28	0,31	0,26	0,23	0,26	0,29	0,27	0,24	0,29	0,19	0,29	0,45	0,27	0,23	0,33	0,25	0,22	0,22	
mannen slecht gediff ca	0,04	0,08	0,09	0,08	0,07	0,11	0,05	0,09	0,14	0,06	0,06	0,02	0,04	0,07	0,03	0,11	0,05	0,03	0,04	0,03	0,08	0,07	0,02	
mannen ongediff (anapl) ca																								
ca	0,10	0,09	0,14	0,04	0,11	0,19	0,03	0,12	0,04	0,13	0,17	0,05	0,12	0,12	0,08	0,11	0,08	0,03	0,05	0,08	0,06	0,09	0,15	
mannen medullair	0,14	0,15	0,13	0,17	0,25	0,22	0,36	0,16	0,11	0,11	0,17	0,16	0,18	0,09	0,10	0,18	0,17	0,14	0,25	0,16	0,12	0,25	0,23	
mannen overig	0,04	0,04	0,03	0,03	0,08	0,01	0,03	0,01	0,04	0,01	0,01	0,01	0,04	0,06	0,09	0,00	0,04	0,00	0,03	0,06	0,04	0,02	0,12	
vrouwen papillair	1,59	1,55	1,26	1,55	1,49	1,47	1,61	1,39	1,72	1,75	1,79	1,79	1,74	2,08	2,07	2,17	2,15	2,61	2,61	2,62	3,08	3,27	3,11	
vrouwen folliculair	0,68	0,73	0,72	0,69	0,68	0,66	0,56	0,48	0,63	0,65	0,51	0,59	0,49	0,59	0,67	0,53	0,62	0,39	0,61	0,70	0,51	0,63	0,85	
vrouwen slecht gediff ca	0,13	0,14	0,06	0,13	0,10	0,04	0,09	0,12	0,12	0,08	0,21	0,13	0,13	0,07	0,11	0,12	0,08	0,15	0,09	0,09	0,15	0,07	0,13	
vrouwen ongediff (anapl) ca																								
ca	0,25	0,20	0,23	0,16	0,15	0,12	0,24	0,19	0,16	0,18	0,21	0,12	0,16	0,14	0,14	0,17	0,11	0,23	0,14	0,19	0,16	0,15	0,12	
vrouwen medullair	0,25	0,18	0,12	0,15	0,27	0,20	0,25	0,26	0,28	0,17	0,15	0,20	0,10	0,18	0,18	0,14	0,17	0,16	0,18	0,19	0,21	0,17	0,21	
vrouwen overig	0,18	0,06	0,14	0,04	0,08	0,07	0,11	0,05	0,01	0,07	0,02	0,05	0,04	0,07	0,09	0,05	0,09	0,06	0,04	0,07	0,08	0,05	0,10	
Mortaliteit totaal	0,57	0,60	0,65	0,50	0,59	0,43	0,56	0,56	0,51	0,40	0,61	0,49	0,46	0,50	0,36	0,37	0,48	0,43	0,39	0,44	0,45	0,42	0,38	
mannen	0,43	0,44	0,53	0,43	0,46	0,41	0,43	0,47	0,49	0,25	0,58	0,40	0,48	0,45	0,26	0,19	0,46	0,29	0,31	0,27	0,42	0,35	0,33	
vrouwen	0,71	0,76	0,77	0,58	0,72	0,44	0,69	0,65	0,52	0,54	0,64	0,58	0,43	0,54	0,46	0,54	0,51	0,56	0,48	0,60	0,49	0,50	0,43	

Cijfers zijn gestandaardiseerd naar de Europese standaard populatie (ESR) en weergegeven per 100.000