

Appendix D: Therapie met ^{169}Er

Tabel D.1: potentiële externe blootstelling ten gevolge van behandeling met 33 MBq ^{169}Er -citraat bij een generiek scenario gedurende 21 dagen na toediening, zonder leefregels.

Blootstelling gedurende rekenperiode (μSv)				
Handeling	Kind	Verzorger <60 jaar	Verzorger ≥ 60 jaar	Derden
Betaald werk	0	0	0	0
Scholing	0	0	0	0
Zorg voor het huishouden	0	0	0	0
Kinderen naar bed brengen	0	0	0	0
Kinderen fysieke verzorging	0	0	0	0
Kinderen hulp met school	0	0	0	0
Kinderen spelen, voorlezen	0	0	0	0
Kind vergezellen	0	0	0	0
Bedrust	0	0	0	0
Vrijen	0	0	0	0
Eten en drinken	0	0	0	0
Overige persoonlijke verzorging	0	0	0	0
Sociale contacten	0	0	0	0
Lezen	0	0	0	0
Kijken (media)	0	0	0	0
Sportbeoefening	0	0	0	0
Sportwedstrijdbezoek	0	0	0	0
Amateurkunstbeoefening	0	0	0	0
Cultuurbezoek	0	0	0	0
Vrijwilligerswerk	0	0	0	0
Bijeenkomstenbezoek	0	0	0	0
Niet geboekt	0	0	0	0

Signaalwaarden			
0,1	0,3	1,5	0,1
1	3	15	0,3
Blootstelling (mSv)			
Kind	Verzorger <60 jaar	Verzorger ≥ 60 jaar	Derden
0,0	0,0	0,0	0,0