

ABR-Zorgregio	Netwerk van zorginstellingen met als doel antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden door afspraken te maken op regionaal niveau.
Arts VG	Arts verstandelijk gehandicapten
Cohort-verpleging	Het verplegen van meerdere patiënten in één of meerdere ruimtes bij elkaar met identieke isolatiemaatregelen. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden bij elke patiënt vervangen (eilandverpleging). Niet alle persoonlijke beschermingsmaatregelen worden gewisseld. Een mondneusmasker en schort mogen langere tijd achter elkaar gedragen worden.
Einddesinfectie	Het desinfecteren, voorafgegaan door reinigen, van de ruimte (oppervlakken, tastvlakken, vloer, spatzones muur) inclusief het sanitair en van alle herbruikbare materialen die in de ruimte aanwezig zijn (zoals afstandsbediening, bedgordijnen). Einddesinfectie vindt plaats na ontslag van categorie 1-patiënten en bij categorie 2-patiënten indien de uitslag van de MRSA-test niet bekend is op het moment van ontslag of overplaatsing. In de langdurige zorg vindt einddesinfectie ook plaats op de laatste dag van eradicatiebehandeling. Einddesinfectie is van toepassing voor zowel patiëntenkamers (waar de patiënt slaapt) en klinische behandelruimtes.
Epidemische stam	MRSA-stam die zich in een zorginstelling/zorgsetting heeft verspreid (verspreiding tussen zorg gerelateerde contacten).
Eradicatie	Het vrijmaken van MRSA door dragerschapbehandeling.
Huisgenoten	Personen die overdag en 's nachts in hetzelfde huis als de index-persoon verblijven en ruimten zoals badkamer, woonkamer of keuken gemeenschappelijk gebruiken.
Invasieve ingreep	Een operatie of het plaatsen of inbrengen van lichaamsvreemde materialen die een verbinding vormen tussen milieu interieur en exterieur zoals drain, een urinekatheter, scoop, centraalveneuze infuuskatheter, arteriële infuuskatheter of externe fixateur.
Kolonisatie	Het zich vestigen en vermenigvuldigen van micro-organismen op huid of slijmvliezen, zonder schade of hinder voor de gastheer.
Infectie	Interactie tussen het micro-organisme en de gastheer leidt tot schade of een veranderde fysiologie bij de gastheer. De schade of veranderde fysiologie kan resulteren in klinisch waarneembare symptomen en verschijnselen, maar ook langdurig onopgemerkt blijven of subklinisch verlopen.

LA-MRSA	Diergerelateerde meticilline-resistente Staphylococcus aureus (livestock-associated meticilline-resistente Staphylococcus aureus). LA-MRSA is gedefinieerd als ST398 in combinatie met een duidelijke expositie aan vee.
LCI	Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding
Medewerker	Medewerker en gastmedewerker in zorginstelling. Hieronder wordt iedereen verstaan die, al dan niet betaald, zorg verleent.
MRSA	Meticilline-resistente Staphylococcus aureus.
MRSA-drager	Een individu bij wie MRSA is vastgesteld onafhankelijk van de locatie op of in het lichaam of de hoeveelheid MRSA.
MRSA-epidemie	Twee of meer patiënten in een zorginstelling zijn gekoloniseerd of geïnfecteerd met dezelfde MRSA-stam. De patiënten hebben een verband in tijd en plaats en er is geen gemeenschappelijke bron buiten de zorginstelling.
MRSA-positief	Zie MRSA-drager
MRSA risicocategorie (patiënt/medewerker)	Risicocategorie op basis van het risico op overdracht van MRSA naar anderen: - Risicocategorie 1: de patiënt/medewerker is MRSA-drager. - Risicocategorie 2: de patiënt/medewerker met hoog risico op MRSA-dragerschap. - Risicocategorie 3: de patiënt/medewerker met een matig verhoogd risico (laag risico) op MRSA-dragerschap. - Risicocategorie 4: de patiënt/medewerker valt niet in één van de drie bovenstaande categorieën.
MRSA-stam	Isolaten die volgens een standaard typeringsmethode tot hetzelfde type behoren.
MRSA-test	De detectie van MRSA berust op de aanwezigheid van het species Staphylococcus aureus en op de aanwezigheid van het mec-A-gen dat codeert voor de aanmaak van een gemodificeerd penicilline-bindend eiwit (PBP-2a). Dit eiwit heeft een verminderde affiniteit voor betalactam antibiotica, waardoor deze groep antibiotica onwerkzaam worden.
OMT	Outbreak management team
Onbeschermd contact	Contact met een MRSA-drager waarbij geen of onvoldoende beschermende maatregelen zijn genomen.
Ongecompliceerde MRSA drager	Individu bij wie MRSA is vastgesteld zonder actieve infectie en:

	- MRSA is in vitro gevoelig voor de toe te passen antibiotica en - er zijn geen actieve huidlaesies en - er is geen lichaamsvreemd materiaal dat een verbinding vormt tussen milieu interieur en milieu exterieur (bijvoorbeeld urine catheter, fixateur externa) en - dragerschap is uitsluitend in de neus gelokaliseerd. Zie de SWAB-richtlijn 'Behandeling MRSA dragers'
Patiënt/Cliënt/Bewoner	Is een persoon die voor diagnostiek en/of behandeling in het ziekenhuis of andere zorginstelling komt of woonachtig is (dit kan klinisch of poliklinisch zijn).
Polikliniek	Omvat alle afdelingen waar onderzoek en behandeling plaatsvindt van patiënten met aandoeningen en ziekten waarvoor specialistische kennis en hulpmiddelen nodig zijn én die niet als klinische afdelingen zijn aangeduid. De indeling van de afdelingen die hieronder vallen moet door het ziekenhuis op basis van de invasiviteit van de ingrepen gemaakt worden.
Ringonderzoek	De meest nabije contacten van de patiënt/cliënt worden eerst onderzocht. Als daar besmetting wordt vastgesteld, wordt het onderzoek uitgebreid naar minder nabije contacten.
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
SWAB	Stichting Werkgroep Antibioticabeleid.
Transmissie	Overdracht van micro-organismen.
Vluchtelingenopvang	Iedere vorm van locatie voor vluchtelingenopvang waar vluchtelingen woonachtig zijn tot de overgang naar een definitieve woning .