

Anamnese bij HSV-1 patiënten

Anamnese bij HSV-1 patiënten;

- Heeft u deze ontsteking vaker door gemaakt en voelt dit het “hetzelfde” aan?
- 5 • HSV-1 keratitis infecties in de voorgeschiedenis?
 - Zijn er mogelijke andere virale verwekkers in de voorgeschiedenis? Bijvoorbeeld VZV, CMV, HSV-2, Adenovirus
 - Zijn er in het verleden infecties geweest met een van de herpes virussen van oogleden of mond?
 - 10 ○ Bij patiënt met recidiverende HSV-1 infecties
 - Wanneer was het laatste recidief?
 - Wat is de frequentie van ontstekingen sinds het vorige consult?
- Contactlens gebruik?
 - Kan acanthamoeba een rol spelen
- 15 • Hoe lang wordt er momenteel behandeld en met welke medicatie?
 - Zijn de klachten opgevlamd tijdens gebruik van antivirale of anti-inflammatoire medicatie?
 - Welke medicatie?
 - Hoe hoog werd er gedoseerd?
 - 20 ○ Welke medicatie is er bij vorige ontstekingsperiodes gegeven?
 - Aandacht voor mogelijk steroïd gebruik zonder antivirale therapie
 - Door huisarts
 - Door verwijzend oogarts
 - Welke medicatie is er de laatste maand gebruikt door patiënt?
 - 25 ▪ Recent lokaal of systemisch steroïden gebruik?
 - Werd er al profylactisch antiviraal behandeld?
- Hoe is de reactie op therapie?

Risicofactoren

- 30 • Oogheelkundig:
 - Voorafgaande intra-oculaire operaties
 - Recent trauma van het oog (mechanisch/chemisch)
 - Recidiverende erosies
 - Verandering medicatiegebruik oogheelkundig, of in de buurt van het oog (CAVE-eczeem medicatie-steroiden)
 - 35 ○ Contactlens gebruik
 - Operaties in het hoofd/hals gebied (aandacht voor sensibiliteitsverlies van het oog)
- Systemische aandoeningen:
 - Immunestatus: immuungecompromiteerde patiënt
 - 40 ▪ HIV
 - Systemische Immuunsuppressie
 - Reumatische patiënt
 - Atopie/eczeem
 - 45 ▪ Meer kans op bilaterale recidiverende therapieresistente herpes keratitis (RRx9)
 - Niet alleen huid van het gelaat beoordelen maar ook navraag doen: cave gewenning van de patiënt aan klachten in en rond het oog
 - Ophogen van steroïden of systemische medicatie voor eczeem geeft hoger risico op recidief herpes
 - 50 ○ Diabetes

- Verwaarlozing / verslaving