

Bevindingen Delphi-studie

Module Niet-operatieve behandeling

| Stelling | % Consensus Eens | | Opmerkingen uit vrije tekst veld |
|--|------------------|----------|---|
| | Basis | Optimaal | |
| Adequate lokale pijnbestrijding (oa PENG blokkade / fenolisatie) dient standaard te worden aangeboden of als behandeloptie worden besproken als onderdeel van de niet-operatieve behandeling naast systemische analgetica (tabletten, pleisters etc) | 84% | 91% | PENG blokkade moet beschikbaar zijn maar patiëntkarakteristieken bepalen of het moet worden ingezet; PENG is niet mogelijk in ieder ziekenhuis |
| Het actief betrekken van naasten dient een integraal onderdeel te zijn bij niet-operatieve behandeling | 90% | 98% | |
| Adequate voorlichting en verwachtingsmanagement dient onderdeel te zijn van niet-operatieve behandeling zowel mondeling als op papier | 88% | 96% | |
| Er wordt gestreefd naar ontslag naar eigen woonomgeving, mits de palliatieve zorg daar geboden kan worden. | 89% | 94% | Alleen indien patiënt en naasten dit ook wensen; rekening houden dat met fenolisatie patiënten nog langer kunnen leven dan is een WLZ setting al goed aangepast (drempels ed) |