

Bevindingen Delphi-studie

Module Osteoporose, valanalyse en fractuurpreventie

Stelling	% Consensus Eens		Opmerkingen uit vrije tekst veld
	Basis	Optimaal	
Tijdens de opname start de behandeling (calcium, vit D, botresoprtieremmer) van patiënten >75 jaar met heupfractuur voor osteoporose.	78%	91%	
Er is een zorgpad om de zorg voor de onderliggende osteoporose te vervolgen.	87%	91%	
Osteoporose en eventuele behandeling worden benoemd in de ontslagbrief.	89%	95%	
Er moet een standaard ontslaggesprek plaatsvinden met aandacht voor verwachtingsmanagement in aanwezigheid van naasten.	88%	94%	
Er moet een multidisciplinaire nazorgpoli zijn met samenwerking tussen snijdende specialisme en beschouwende specialisme	18%	73%	Fysiotherapeut kan een rol vervullen qua mobiliteit; arts ergo en fysio combineren zou mooi zijn
Patiënten moeten standaard na 6 weken worden teruggezien op de polikliniek	22%	21%	6 weken is chirurgisch niet bijdragend; standaard is niet wenselijk; standaard controles kunnen een extra belasting zijn zonder meerwaarde voor patiënt; follow-up hoeft niet altijd door ziekenhuisarts te gebeuren; kan dit met huidige druk op zorgstelsel moeilijk organiseren
Patiënten moeten op indicatie na 6 weken worden teruggezien op de polikliniek	85%	91%	Patiënten zijn vaak onzeker over uitkomst operatief tijdens revalidatie waarbij controle foto en consult dit kunnen wegnemen;
Er moet na 6 weken standaard een controle foto worden gemaakt	17%	4%	Moet op indicatie;
Patiënten moeten standaard na 3 maanden worden teruggezien op de polikliniek.	12%	17%	Controle na 3 maanden op indicatie; kan ook telefonisch;
Patiënten moeten op indicatie (conform richtlijn osteoporose en fractuurpreventie) binnen 3 maanden een afspraak krijgen op de polikliniek gericht op diagnostiek en behandeling. (Gaat om patiënten waarbij nog geen behandeling is gestart in het ziekenhuis)	59%	80%	
Indien er een indicatie is voor wet langdurige zorg (WLZ) na opname binnen de geriatrische	90%	91%	

revalidatie zorg (GRZ) moet worden gerevalueerd of follow-up afspraken nog zinnig zijn.			
	% Consensus Oneens		
Stelling	Basis	Optimaal	
Er moet een multidisciplinaire nazorgpoli zijn met samenwerking tussen snijdende specialisme en beschouwende specialisme	41%	Nvt	
Patiënten moeten standaard na 6 weken worden teruggezien op de polikliniek	59%	63%	
Er moet na 6 weken standaard een controle foto worden gemaakt	73%	76%	
Patiënten moeten standaard na 3 maanden worden teruggezien op de polikliniek.	73%	71%	