

## Bijlage Samenvatting aanbevelingen vaccinaties bij JIA

### 1. Rijksvaccinatieprogramma 2025 \*

| Wanneer       | Vaccinatie  | Beschermst tegen  | Advies Richtlijn  | Opmerkingen                                       |
|---------------|---|---|---|---|
| 6-9 weken     | <a href="#">1. Rotavirusvaccinatie*</a>                           | Rotavirus   | Niet veilig voor kinderen op immunosuppressiva                            |   |
|               | <a href="#">2. DKTP-Hib-HepB**</a>                                | Difterie, kinkhoest, tetanus, polio, haemophilus influenzae type b, hepatitis B |   |   |
| 3 maanden     | <a href="#">1. Rotavirusvaccinatie*</a>                           | Rotavirus   | Niet veilig voor kinderen op immunosuppressiva                            |   |
|               | <a href="#">2. DKTP-Hib-HepB</a>                                  | Difterie, kinkhoest, tetanus, polio, haemophilus influenzae type b, hepatitis B |   |   |
|               | <a href="#">3. Pneumokokken</a>                                   | Pneumokokken  | Voorkeur voor breed pneumokokken-vaccin                                   |   |
| 5 maanden     | <a href="#">1. DKTP-Hib-HepB</a>                                  | Difterie, kinkhoest, tetanus, polio, haemophilus influenzae type b, hepatitis B |   |   |
|               | <a href="#">2. Pneumokokken</a>                                   | Pneumokokken  | Voorkeur voor breed pneumokokken-vaccin                                   |   |
| 12 maanden*** | <a href="#">1. DKTP-Hib-HepB</a>                                  | Difterie, kinkhoest, tetanus, polio, haemophilus influenzae type b, hepatitis B |   |   |
|               | <a href="#">2. Pneumokokken</a>                                   | Pneumokokken  | Voorkeur voor breed pneumokokken-vaccin                                   |   |
| 14 maanden    | <a href="#">1. BMR</a>  | Bof, mazelen, rode hond   | Niet veilig voor kinderen op immunosuppressiva                            | Toch overwegen bij mazelen uitbraak               |
|               | <a href="#">2. MenACWY</a>  | Meningokokken ACWY  | Werkt mogelijk onvoldoende  | Booster wordt aangeraden als patiënt op anti-TNFa |
| 2,5-3,5 jaar  | <a href="#">1. BMR booster</a>                                    | Bof, mazelen, rode hond   | Wel veilig bij sommige medicatie (in tegenstelling tot BMR op 14 maanden) |   |
| 5 jaar        | <a href="#">1. DKT</a>  | Difterie, kinkhoest, tetanus,   |   | (Vanaf 2026)                                      |
| 10 jaar       | <a href="#">HPV (2x, 2<sup>e</sup> vaccinatie halfjaar later)</a> | Humaan papillomavirus   | Extra booster 3-dosisschema (0-1-6 maanden) bij immuun-gecompromitteerden | LCI richtlijn HPV-vaccinatie                      |
| 14 jaar       | <a href="#">1. MenACWY</a>  | Meningokokken ACWY  | Extra booster wordt aangeraden als patiënt op anti-TNFa (na 6-12 maanden) |   |
|               | <a href="#">2. DTP</a>  | Difterie, tetanus, polio  |   | (Vanaf 2030)                                      |

\* De timing van de vaccinaties zullen veranderen in de komende jaren, maar dit wijzigt niet de adviezen van de werkgroep per vaccin. Voor meer informatie zie: <https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals>

## 2. Buiten Rijksvaccinatieprogramma

| Vaccinatie                               | Beschermst tegen | Advies Richtlijn  | Opmerkingen   |
|--|------------------|---|---|
| Pneumokokken vaccin:<br>PVC13 of PVC15   | Pneumokokken     | PPSV-23 bij ernstig immuungecompromiteerden   |   |
| Tetanus-booster (na trauma, val of beet) | Tetanus          |   | Bij B-cel depletende therapie: passieve en actieve vaccinatie |
| Griep vaccin                             | Griep            | Jaarlijks aan alle pt met JIA op immunosuppressiva  |   |
| Covid-19 vaccin                          | Covid-19         |   |   |
| Meningokokken B vaccin                   | Meningokokken B  | Kan als additioneel vaccin overwogen worden; keuze van ouders en patiënt, wordt niet vergoed  |   |
| Varicella zoster vaccin (VZV)            | Varicella zoster | Als varicella-naïef: liefst wanneer zonder medicatie of met MTX-monotherapie, kan overwogen worden bij low dose prednisolon, anti IL-1 en anti IL-6 |   |
| Overige levende vaccins                  |                  | Niet veilig   |   |

## 3. Reisvaccinaties

| Vaccinatie              | Beschermst tegen | Advies Richtlijn |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Niet-levende vaccins    |                  |                  |
| Gele koorts vaccin      | Gele koorts      | Niet veilig      |
| Overige levende vaccins |                  | Niet veilig      |