

Tabel 1 Risicofactoren welke worden gebruikt voor de afweging wel of niet screenen op TSH

	NIV 2012 (A)	Lokale protocollen (B)	ATA 2017 (C)	RCOG (D)
Geschiedenis van schildklierfunctiestoornissen	X	X	X	X
Voorgeschiedenis schildklierchirurgie	X	X	X	X
Symptomen van schildklierfunctiestoornis (1)	X	X	X	X
Aanwezigheid van struma	X	X	X	X
TPOAb positiviteit	X	X	X	X
Type 1 diabetes	X	X	x	X
Andere auto-immuunziekte (2)	X	X	X	X
Geschiedenis van meerdere miskramen	X	X	X	
Geschiedenis van vroegtijdige bevallingen	X	X	X	X
Geschiedenis van bestraling van hoofd of hals	X	X	X	X
Familiegeschiedenis van schildklierstoornissen (3)	X	X	X	X
Gebruik van amiodaron	X	X	X	X
Gebruik van lithium	X	X	X	X
Recente toediening van jodium houdende contrastmiddelen (4)	X	X	X	X
In de late postpartum periode malaise en stemmingswisselingen		X		
Morbide obesitas (BMI > 40 kg/m ²)	X	X	X	
Leeftijd > 30 jaar		X	x	
Postpartum depressie		x		
Hyperemesis gravidarum		X		
Lage jodiumconsumptie (veganisten/vegetariër)		x		
Intra-uteriene vruchtdood (alleen aanbevolen indien niet bepaald ten tijde van de sterfte)		x		x
Fertiliteit behandeling		x		
Infertiliteit			X	
Meerdere eerdere zwangerschappen (≥2)			X	
Woonachtig in gebied met hoge prevalentie jodium tekort			X	

Voorgeschiedenis van (postpartum/Hashimoto) thyreoïditis		x		x
--	--	---	--	---

- (A) Richtlijndatabase, initiatiefnemer Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Schildklierstoornis zwangerschap & postpartum, 2012. [Schildklierstoornis zwangerschap & postpartum - Richtlijn - Richtlijndatabase](#)
- (B) Er zijn verschillende protocollen geraadpleegd, zowel lokale protocollen uit ziekenhuizen, VSV protocollen én regionale protocollen waarin meerdere VSV's en ziekenhuizen aan deelnemen. De volgende protocollen heeft de werkgroep ingezien.
- EMC Rotterdam (lokaal protocol)
 - Amsterdam UMC (lokaal protocol)
 - UMC Utrecht (lokaal protocol)
 - UMC Groningen (regionaal protocol)
 - Isala Zwolle (lokaal protocol)
 - Regio noordwest Nederland (regionaal protocol)
 - Geboortezorg consortium Midden Nederland (regionaal protocol)
 - ZiZO Brabant – geboortezorg Eindhoven/Anna/Veldhoven (VSVI protocol)
 - VSV Twente (VSV protocol)
 - VSV Haaglanden (VSV protocol)
 - VSV Rotterdam-Zuid (regionaal)
 - VSV Middenin, geboortezorg omgeving Heerenveen (VSV protocol)
 - VSV Oost Achterhoek (VSV protocol)
 - VSV Zwolle e.o. (VSV protocol)
 - VSV Zoetermeer (VSV protocol)
- (C) American Thyroid Association Guidelines for diagnosis and management of Thyroid disease during pregnancy, 2017. [Guidelines for Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy](#)
- (D) Royal College of Obstetricians & Gynecologists, Management of Thyroid disorders in pregnancy, 2023. RCOG Green top guideline. [thyroiddisordersinpregnancyvpeerreviewfinal.pdf \(rcog.org.uk\)](#)
- (1) Er worden verschillende symptomen gebruikt in de richtlijnen en protocollen: gewichtstoename, kouwelijkheid, obstipatie, bradycardie, myxoedeem in het gezicht, traagheid.
- (2) Er worden verschillende auto-immuunziekte genoemd als voorbeelden in de verschillende richtlijnen en protocollen: Morbus Addison, pernicioze anemie, vitamine B12 deficiëntie, systemisch lupus erythematoses, idiopathische trombocytopenische purpura, vitiligo, alopecia areata, coeliakie, SLE, anti-

Ro/anti-La positiviteit, anti-fosfolipiden syndroom, bijnierinsufficiëntie, hypoparathyreoïdie, atrofische gastritis, systemische sclerose, syndroom van Sjogren.

- (3) De definitie van familiegeschiedenis wordt wisselend gedefinieerd. In de meeste richtlijnen/protocollen staat geen verdere toelichting. In de richtlijnen/protocollen waar wel een verdere definitie staat wordt gezegd: een ouder, zus of broer met schildklierziekte oftewel 1^e graad familielid.
- (4) Er zijn wisselende adviezen voor de tijdsaanduiding waarbinnen het jodium houdend contrastmiddel is toegediend. Deze variëren tussen <6 weken en < 6 maanden, waarbij in de meeste richtlijnen/protocollen geen tijdsaanduiding wordt gegeven.