

Patiënten informatie na lasertherapie in verband met PeIN

Postoperatieve instructies:

Wondverzorging (24 uur na behandeling):

- Start met 2 keer per dag spoelen onder de douche;
- Dep of veeg wondbeslag af met gazen gedrenkt in kraanwater;
- Breng vervolgens Betadine zalf aan (door patiënt zelf aan te schaffen bij de drogist);
- Continueer dit wondbeleid tot aan volledige wondgenezing.

Adviezen

- De eerste twee dagen niet sporten.
- Niet baden, zwemmen of sauna bezoeken totdat de wond(en) is/zijn geheeld.
- Ter bescherming van het ondergoed kan tijdelijk een inlegger/maandverband gebruikt worden.

Pijnbestrijding

- Afhankelijk van de pijn kunt u zo nodig paracetamol 1000 mg tot maximaal 4 keer per dag gebruiken.
- Eventueel aanvullend ibuprofen 400 mg 1-3 keer per dag zo nodig.

Controle

- Een telefonische evaluatie vindt na 2-4 weken plaats.
- Een fysieke controle vindt na 8-12 weken plaats.
- Neem eerder contact op bij tekenen van een infectie (roodheid, zwelling, pijn, puslekkage, ziek zijn of koorts), een nabloeding of onhoudbare klachten van pijn.