

Kind met buikpijn/verdenking op *H. pylori* ¹

Alarmsymptomen² of 1e-graads familielid met maagkanker?

Geen alarmsymptomen

1e-graads familielid met maagkanker

Voer geen diagnostiek naar *H. pylori* uit.

Voer gastroduodenoscopie uit. Bij macroscopische afwijkingen: neem 6 bipten (3 antrum en 3 corpus), kweek en resistentie

Beslis samen met ouders/verzorgers over eventuele screening met feces-antigeentest.

Alarmsymptomen

Uitslag?

H. pylori negatief

H. pylori positief

Geen *H. pylori*-infectie als oorzaak van klachten

Behandel op basis van resistentiepatroon.
Zie tabel module Behandeling

6-8 weken na stoppen behandeling:
Voer monoclonale feces-antigeentest of ¹³C-ureum ademtest uit.

Eradicatie geslaagd en/of klachten?

Eradicatie geslaagd en geen klachten

Eradicatie niet geslaagd en/of nog klachten

Ontslag
(tenzij sprake van ulcus)

Overweeg tweede behandeling
Zie tabel module Behandeling

1. Kinderen met buikpijn die niet anders te verklaren is en/of niet functioneel is en/of nachtelijke buikpijn en/of epigastrische pijn. En wanneer andere oorzaken uitgesloten zijn bij refractaire of recidiverende ijzergebreksanemie ondanks ijzersuppletie;
2. Anamnese: ongewild gewichtsverlies, gastro-intestinaal bloedverlies, fors braken, chronische diarree, onverklaarde koorts, gewrichtsklachten, positieve familieanamnese voor inflammatoire darmziekten (IBD), coeliakie of familiale mediterrane koorts. Lichamelijk onderzoek: afbuigende groeicurve, koorts, uveïtis, orale aften, erythema nodosum, artritis, icterus, vermoeden anemie, hepatosplenomegalie, perianale afwijkingen.