

Verkeerslicht en (de-)implementatietabel

Verkeerslichtanalyse



- **ROOD** = sterk geformuleerde aanbeveling om iets niet te doen, met een GRADE high of moderate
- **ORANJE** = zwak geformuleerde aanbeveling; mogelijk kennishiaat
- **GROEN** = sterk geformuleerde aanbeveling om iets wel te doen, met een GRADE high of moderate
- **LICHT ROOD** of **LICHT GROEN** = sterk geformuleerde aanbevelingen met een GRADE low, very low of geen GRADE (*modules waarin geen studies geïnccludeerd konden worden in de literatuursamenvatting of waarin geen literatuursamenvatting werd geschreven zoals modules waarin organisatie van zorg wordt beschreven*)

Aanbeveling	Sterkte van de aanbeveling	Bewijskracht per uitkomstmaat	Verkeerslicht per (sub)aanbeveling
Overweeg screening op alcoholgebruik bij het optreden van de volgende symptomen: <i>Leverziekten</i> • Spider naevi; • Ascites en perifeer oedeem; • Hepatische encefalopathie; • Bloedingen door portale hypertensie; • Caput medusae; • Erythema palmare; • Icterus; • Algehele malaise met verlies van eetlust en gewichtsverlies; • Koorts; • Pijnlijke bovenbuik door hepatomegalie; • Tekenen van lever decompensatie. <i>Neurologische en psychiatrische klachten</i> • Perifere neuropathie; • Auditieve hallucinaties;	☐ Sterk (doe/ gebruik) / ☒ Zwak (overweeg)	Overall bewijskracht ☐ H ☐ M ☐ L ☐ VL ☐ NG Range bewijskracht van alle uitkomstmaten ☐ H ☐ M ☐ L ☐ VL ☐ NG OF X voor de (sub)uitgangsvraag is geen systematische literatuur analyse uitgevoerd	☐ ROOD : vul tabel A in ☐ LICHT ROOD : vul tabel A in ☒ ORANJE : gebruik tabel B ☐ LICHT GROEN : vul tabel A in ☐ GROEN : vul tabel A in

• Depressieve stoornissen; • Verwardheid; • Visuele hallucinaties; • Desoriëntatie; • Loopstoornis; • Oogbewegingsstoornis; • Veranderde mentale staat; • Anhedonie; • Waanideeën, waaronder jaloersheidswaan ; • Angst; • Collaps en blackouts; • Psychosociale problemen; • (Sub)acute ataxie. <i>Onthoudingssymptomen</i> • Autonome hyperactiviteit (bijvoorbeeld transpireren of een polsfrequentie hoger dan 100 p/min); • Toegenomen tremor van de handen; • Insomnia; • Passagère visuele, tactiele of auditieve hallucinaties of illusoire vervalsingen; • Psychomotorische agitatie; • Gegeneraliseerde tonisch-clonische insulten. <i>Gastro-intestinale klachten</i> • Zuurbranden; • Misselijkheid;			
--	--	--	--

• Diarree; • Voedingsdeficiëntie. <i>Mond en keel</i> • Slikklachten; • Heesheid; • Ulcus van het mondslijmvlies. <i>Cardiale klachten</i> • Benauwdheid; • Moeheid; • Palpitaties; • Tachycardie; • Perifeer oedeem; • Hypertensie. <i>Urogenitale klachten</i> • Erectiele disfunctie; • Testiculaire atrofie; • Amenorroe; • Infertiliteit; • Spontane abortus; • Seksuele problemen. <i>Overige klachten</i> • Bilaterale parotisklier hypertrofie; • Traanklier hypertrofie; • Spieratrofie; • Ondervoeding/afvallen/anorexia; • Contractuur van Dupuytren; • Gynaecomastie; • Bacteriële infectie; • Pijnlijke en gezwollen spieren; • Botfracturen;			
---	--	--	--

• Trauma en verwondingen; • Bleekheid; • Verhoogde bloedingsneiging. NB: deze lijst van symptomen is niet volledig, er kunnen meer symptomen zijn die kunnen wijzen op overmatig alcoholgebruik. Daarnaast is het belangrijk om ook andere potentiële oorzaken uit te sluiten.			
---	--	--	--

Implementatietabel

Aanbeveling	
Overweeg screening op alcoholgebruik bij het optreden van de volgende symptomen: <i>Leverziekten</i> • Spider naevi; • Ascites en perifeer oedeem; • Hepatische encefalopathie; • Bloedingen door portale hypertensie; • Caput medusae; • Erythema palmare; • Icterus; • Algehele malaise met verlies van eetlust en gewichtsverlies; • Koorts; • Pijnlijke bovenbuik door hepatomegalie; • Tekenen van lever decompensatie. <i>Neurologische en psychiatrische klachten</i> • Perifere neuropathie; • Auditieve hallucinaties; • Depressieve stoornissen; • Verwardheid; • Visuele hallucinaties; • Desoriëntatie; • Loopstoornis; • Oogbewegingsstoornis; • Veranderde mentale staat; • Anhedonie; • Waanideeën, waaronder jaloersheidswaan; • Angst; • Collaps en blackouts; • Psychosociale problemen; • (Sub)acute ataxie. <i>Onthoudingssymptomen</i> • Autonome hyperactiviteit (bijvoorbeeld transpireren of een polsfrequentie hoger dan 100 p/min); • Toegenomen tremor van de handen; • Insomnia;	Op basis van de beschikbare evidentie en ervaring uit de praktijk kon er onvoldoende richting aan de besluitvorming worden gegeven. Om die reden is er geen beschrijving van belemmeringen en kansen voor implementatie van de aanbeveling toegevoegd. Wel is de werkgroep van mening dat het belangrijk is om extra aandacht te geven aan de disseminatie van de kennis in deze module. Dit omdat het niet vanzelfsprekend is dat publicatie van deze module op de Richtlijndatabase ertoe leidt dat de aanbevelingen bekend worden bij- en toegepast worden door de gehele doelgroep. Disseminatie van de kennis in deze module verloopt daarom via de volgende routes: • De module wordt gepubliceerd op de Richtlijndatabase; • De module krijgt extra aandacht in het nieuwsbericht dat bij de publicatie zal verschijnen; • De betrokken WV-en en andere stakeholders zullen worden gevraagd om deze module expliciet onder de aandacht te brengen bij hun achterban; • Waar mogelijk zal er aandacht worden gegeven aan o.a. deze module in een nog te schrijven artikel dat zal verschijnen in bijvoorbeeld het NTvG of het Medisch Contact.

• Passagère visuele, tactiele of auditieve hallucinaties of illusoire vervalsingen; • Psychomotorische agitatie; • Gegeneraliseerde tonisch-clonische insulten. <i>Gastro-intestinale klachten</i> • Zuurbranden; • Misselijkheid; • Diarree; • Voedingsdeficiëntie. <i>Mond en keel</i> • Slikklachten; • Heesheid; • Ulcus van het mondslijmvlies. <i>Cardiale klachten</i> • Benauwdheid; • Moeheid; • Palpitaties; • Tachycardie; • Perifeer oedeem; • Hypertensie. <i>Urogenitale klachten</i> • Erectiele disfunctie; • Testiculaire atrofie; • Amenorroe; • Infertiliteit; • Spontane abortus; • Seksuele problemen. <i>Overige klachten</i> • Bilaterale parotisklier hypertrofie; • Traanklier hypertrofie; • Spieratrofie; • Ondervoeding/ afvallen/ anorexia; • Contractuur van Dupuytren; • Gynaecomastie; • Bacteriële infectie; • Pijnlijke en gezwollen spieren; • Botfracturen; • Trauma en verwondingen; • Bleekheid; • Verhoogde bloedingsneiging.	
---	--

NB: deze lijst van symptomen is niet volledig, er kunnen meer symptomen zijn die kunnen wijzen op overmatig alcoholgebruik. Daarnaast is het belangrijk om ook andere potentiële oorzaken uit te sluiten.	
---	--