

Verkeerslicht en (de-)implementatietabel

Verkeerslichtanalyse



- **ROOD** = sterk geformuleerde aanbeveling om iets niet te doen, met een GRADE high of moderate
- **ORANJE** = zwak geformuleerde aanbeveling; mogelijk kennishiaat
- **GROEN** = sterk geformuleerde aanbeveling om iets wel te doen, met een GRADE high of moderate
- **LICHT ROOD** of **LICHT GROEN** = sterk geformuleerde aanbevelingen met een GRADE low, very low of geen GRADE (*modules waarin geen studies geïnccludeerd konden worden in de literatuursamenvatting of waarin geen literatuursamenvatting werd geschreven zoals modules waarin organisatie van zorg wordt beschreven*)

Aanbeveling	Sterkte van de aanbeveling	Bewijskracht per uitkomstmaat	Verkeerslicht per (sub)aanbeveling
Gebruik voor het screenen op overmatig en zwaar alcoholgebruik eerst een gevalideerde vragenlijst, zoals de AUDIT-C. Overweeg de inzet van fosfatidylethanol (PEth) voor de detectie van overmatig en zwaar alcoholgebruik in de acute of poliklinische setting bij een negatieve AUDIT-C en een vermoeden op overmatig of zwaar alcoholgebruik. Wees terughoudend met de inzet van ethylglucuronide (EtG) en carbohydrate-deficient transferrin (%CDT) voor de detectie van overmatig of zwaar alcoholgebruik, aangezien er geen uitspraak gedaan kan worden over de waarde hiervan in verband met het ontbreken van literatuur.	☐ Sterk (doe/gebruik) / X Zwak (overweeg)* *Het eerste deel van de aanbeveling is sterk geformuleerd, maar de focus van deze module ligt op het tweede en derde deel van de aanbeveling, die allebei zwak zijn geformuleerd.	Overall bewijskracht ☐ H ☐ M ☐ L X VL ☐ NG Range bewijskracht van alle uitkomstmaten ☐ H ☐ M ☐ L X VL X NG OF ☐ voor de (sub)uitgangsvraag is geen systematische literatuur analyse uitgevoerd	☐ ROOD: vul tabel A in ☐ LICHT ROOD: vul tabel A in X ORANJE: gebruik tabel B ☐ LICHT GROEN: vul tabel A in ☐ GROEN: vul tabel A in

Implementatietabel

Aanbeveling	
Gebruik voor het screenen op overmatig en zwaar alcoholgebruik eerst een gevalideerde vragenlijst, zoals de AUDIT-C. Overweeg de inzet van phosphatidylethanol (PEth) voor de detectie van overmatig en zwaar alcoholgebruik in de acute of poliklinische setting bij een negatieve AUDIT-C en een vermoeden op overmatig of zwaar alcoholgebruik. Wees terughoudend met de inzet van ethylglucuronide (EtG) en carbohydrate-deficient transferrin (%CDT) voor de detectie van overmatig of zwaar alcoholgebruik, aangezien er geen uitspraak gedaan kan worden over de waarde hiervan in verband met het ontbreken van literatuur.	Op basis van de beschikbare evidentie en ervaring uit de praktijk kon er onvoldoende richting aan de besluitvorming worden gegeven. Om die reden is er geen beschrijving van belemmeringen en kansen voor implementatie van de aanbeveling toegevoegd. Disseminatie van de kennis in deze module verloopt via de standaard route. De module wordt gepubliceerd op de Richtlijndatabase.