


Patiënt die een DOAC gebruikt en een spoedingreep moet ondergaan



DOAC: Directe Orale Anticoagulantia

Voetnoten:

1. Als uitstel van de spoedingreep leidt tot een levensbedreigende situatie overweeg dan om te couperen:

- Bij gebruik Xa-remmer^{***}: Overweeg om PCC te geven en houd bij de ingreep rekening met verhoogde bleedingsneiging.
- Bij gebruik dabigatran: Overweeg om idarucizumab te geven

2. Hierbij gaat het om de volgende situaties:

- Primaire preventie van veneuze trombo-embolie (VTE) bij volwassenen na een electieve totale heup- of knieervangende operatie;
- Preventie van recidief diep veneuze trombose (DVT) en longembolie (PE); (langdurig) gebruik lage dosis DOAC na behandeling VTE met volle dosis gedurende 3- 6 maanden

3. Andexanet alfa is niet geregistreerd voor het couperen van een orale Xa remmer bij noodzaak tot een spoedingreep

NB1: Dit stroomschema hoort bij de module 'Strategie bij bloeding of spoedingreep bij DOACs' van de richtlijn 'Antitrombotisch beleid'. Lees altijd de overwegingen en aanbevelingen van de betreffende module voor nuances, eventuele afwijkende situaties en extra achtergrondinformatie.

NB2: Betrek de patiënt bij de besluitvorming.