

Patiënt met een relevant trauma

Minstens één van de volgende hoog risico factoren aanwezig?

- verminderd bewustzijn (EMV<15)
- significante intoxicatie
- ≥65 jaar en acute pijn in de nek en/ of ossale drukpijn
- neurologische uitval
- een gevaarlijk traumamechanisme¹

¹De relevantie moet bij elk ongeval ingeschat worden door de (medisch) professional, maar voorbeelden van dergelijke traumamechanismen zijn:

- val van ≥1 meter hoogte of ≥ 5 traptreden
- axiaal trauma (duik of zwaar voorwerp op hoofd)
- ongeval met motorvoertuig met hoge snelheid
- uit voertuig geslingerd of voertuig over de kop geslagen
- relevante aanrijding tweewielers

²Test de actieve rotatie alleen bij afwezigheid van de bovenstaande hoog risico factoren en aanwezigheid van minstens één van de genoemde laagrisicofactoren.

Nee

Minstens één van de volgende laag risico factoren aanwezig?

De patiënt:

- is betrokken bij een kop-staart botsing met lage snelheid
- is comfortabel in een zittende positie
- heeft gelopen na het ongeval
- heeft geen ossale drukpijn
- heeft later ontstane, dus niet direct na het trauma, nekpijn

Ja

Verdenking op een acuut
traumatisch cervicaal
wervelletsel

Nee

Kan de patiënt zijn
nek 45 graden naar
links en rechts
bewegen?²

Nee

Ja

Geen verdenking op een
acuut traumatisch
cervicaal wervelletsel