

Bijlage Prognostisch model niet-epitheliale maligne ovariumtumoren (Murugaesu, 2006)

	Dysgerminoom	Non-dysgerminoom
Goede prognose	<ul style="list-style-type: none"> • normaal AFP • én elke β-hCG en LDH waarde • én geen extrapulmonale viscerale metastasen 	<ul style="list-style-type: none"> • AFP < 1000 μg/L • én β-hCG < 5000 IU/L • én LDH < 1,5 x de bovengrens van de normaalwaarde • én geen extrapulmonale viscerale metastasen
Intermediaire prognose	<ul style="list-style-type: none"> • normaal AFP • én elke β-hCG en LDH waarde • én extrapulmonale viscerale metastasen 	<ul style="list-style-type: none"> • Geen extrapulmonale viscerale metastasen • AFP 1000- 10000 μg/L • β-hCG 5000 - 50000 IU/L • LDH 1,5 - 10 x de bovengrens van de normaalwaarde
Slechte prognose	Komt niet voor in deze groep	<ul style="list-style-type: none"> • AFP > 10000 μg/L • óf β-hCG > 50000 IU/L • óf LDH > 10 x de bovengrens van de normaalwaarde • óf extrapulmonale viscerale metastasen • óf primair mediastinale lokalisatie