

1. NVU Nederlandse Vereniging voor Urologie

SPOEDINGREPEN UROLOGIE		
Aandoening / toestandbeeld	Categorie	Voorbeelden van ingreep / aandoening
Alle operaties i.v.m. ernstige bedreiging ademweg, ademhaling of centrale circulatie	1	<ul style="list-style-type: none"> – Niertrauma, met laceratie van kapsel en nierbekken met ernstige bloeding – Niertrauma met afscheuring van de vaten – Niertrauma met circulatoire instabiliteit – Multi-trauma met urologische pathologie en circulatoire instabiliteit – Nabloeding na urologische ingrepen (met hemodynamische instabiliteit) – Niet te controleren bloeding (nier/blaas/prostaat) – Intra-abdominale bloeding waarbij shock – Gangreen van Fournier
Acute buik (ischemie/ perforatie/ sepsis/ strangulatie/ bloeding/ platzbauch) zonder ernstige hemodynamische of respiratoire instabiliteit	2	<ul style="list-style-type: none"> – Peritonitis – Darmischemie of andere orgaanbedreigende ischemie – Darmnaadlekkages – Darmperforatie – Ileus – Platzbauch met evisceratie
Infectieuze ziektebeelden met hemodynamische instabiliteit	2	<ul style="list-style-type: none"> – Septische shock bij pyonefrose/pusnier met stuwung – Septische shock bij urine lekkage
Vaatletsel, tijdelijk controleerbare (na)bloeding of vaatafsluiting	2	<ul style="list-style-type: none"> – Nabloeding van TURP of TURB – Spoelen of coagulatie van de blaas bij blaasbloeding
Ischemie orgaan of zenuw	2	<ul style="list-style-type: none"> – Ingeklemden breuken – Torsio testis (vanaf ontstaan binnen 6 uur te opereren) – Paraphimosis – Penisfractuur (letsel van tunica albuginea) – Testiculair hematoom
Wonden/ weke delen letsel/ pees letsel/ hematomen	2	<ul style="list-style-type: none"> – Hechten scrotum na trauma – Wonden urogenitaal
Niet septische beelden, drainage, punctie, diagnostiek, met complicerende factoren (leeftijd, pijn, lange termijn prognose, weke delen)	2	<ul style="list-style-type: none"> – Blaasdrainage – Aanleg ureterocutane stomie (kinderurologie) – Acute urineretentie (met complicerende factoren: kind, veel pijn) – Urineretentie (indien transurethrale katheterisatie niet mogelijk is): Plaatsen suprapubische catheter. – Spoed ureterorenoscopie bij onbehandelbare pijn bij stenen – Inbrengen JJ catheter/URS bij ureterobstructie en mononier – Ureterobstructie (met complicerende factoren: hevige pijn, koorts, mononier, risico chronisch nierfunctieverlies, electrolytstoornis) – Platzbauch (met volledige evisceratie) – Priapisme (inclusief Shunt/spoelen corpora cavernosa-spongiosum)
Maligniteit zeer snel groeiend	3	<ul style="list-style-type: none"> – Testistumor wv. orchidectomie
Niet septische beelden, drainage, punctie, diagnostiek, zonder complicerende factoren	3	<ul style="list-style-type: none"> – Ureterotomie bij steen – Nefrectomie bij stenen/infectie – Inbrengen JJ catheter/URS bij unilaterale ureterobstructie – Testisruptuur
Infectieuze ziektebeelden zonder hemodynamische instabiliteit	3	<ul style="list-style-type: none"> – Sepsis bij pyonefrose/pusnier met stuwung – Sepsis bij urinelekkage – Nierabces
Prenatale of postnatale correctie van congenitale deformiteiten	3	<ul style="list-style-type: none"> – Congenitale hydronefrose – Prenatale torsio zonder acute inflammatoire verschijnselen
Niet electief planbare ingrepen (meestal zonder bijkomende risico factoren leeftijd, lange termijn prognose, weke delen of pijn)	4	<ul style="list-style-type: none"> – Circumcisie bij balanitis – Extrophia vesicae