

## Bijlage Stop- en herstarttermijnen voor de meest gebruikte combinaties van antitrombotica bij patiënten die een neuraxisblokkade ondergaan

Antitrombotica hoofdgroep en combinaties  (per middel het advies volgen in horizontale leesrichting)	Tijdsinterval laatste gift antitromboticum en neuraxisblokkade	Tijdsinterval neuraxisblokkade en volgende gift antitromboticum	Tijdsinterval laatste gift antitromboticum en verwijderen neuraxis-catheter	Tijdsinterval verwijderen neuraxis-catheter en volgende gift antitromboticum	Toediening met neuraxis-catheter in situ
<b>ASA in combinatie met</b>					
<b>ASA als sec.profylaxe</b>	<b>Continueren</b>	<b>Continueren</b>	<b>Continueren</b>	<b>Continueren</b>	<b>Continueren</b>
Clopidogrel	5-7 dagen	7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen bij catheter in situ	7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
Prasugrel	7dagen	7 uur na verwijderen catheter		7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
Ticagrelor	5dagen	7 uur na verwijderen catheter		7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
Dipyridamol	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren
<b>Vitamine K antagonisten in combinatie met</b>					
<b>VKA's</b>	<b>Acenocoumarol 3dg Fenprocoumon 5 dg en INR&lt;1.8</b>	<b>Geen, mits INR&lt;1.8 en geen catheter in situ</b>	<b>Niet aanbevolen bij catheter in situ</b>	<b>Geen, mits INR&lt;1.8, en geen oplaad dosis</b>	<b>Niet aanbevolen</b>
ASA sec profylaxe	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren
ASA sec profylaxe +	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren
Dipyridamol	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren
Clopidogrel	5-7 dagen	7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen bij catheter in situ	7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
Prasugrel	7dagen	7 uur na verwijderen catheter		7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen

Ticagrelor	5 dagen	7 uur na verwijderen catheter		7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
ASA ± Dipyridamol sec profylaxe	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren
+					
Clopidogrel	7 dagen	7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen bij catheter in situ	7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
Prasugrel	7dagen	7 uur na verwijderen catheter		7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
Ticagrelor	5 dagen	7 uur na verwijderen catheter		7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
<b>LMWH in combinatie met</b>					
<b>LMWH profylaxe</b>	<b>10 uur</b>	<b>4 uur</b>	<b>10 uur</b>	<b>4 uur</b>	<b>Continueren</b>
ASA ± Dipyridamol sec profylaxe	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren
Clopidogrel	5-7 dagen	7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen bij catheter in situ	7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
Prasugrel	7dagen	7 uur na verwijderen catheter		7 uur na verwijderen catheter	
Ticagrelor	5dagen	7 uur na verwijderen catheter		7 uur na verwijderen catheter	
ASA sec profylaxe	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren
+					
Clopidogrel	7 dagen	7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen bij catheter in situ	7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
Prasugrel	7dagen	7 uur na verwijderen catheter		7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
Ticagrelor	5 dagen	7 uur na verwijderen catheter		7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
ASA ± Dipyridamol sec profylaxe	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren
+					
Clopidogrel	7 dagen	7 uur na verwijderen catheter		7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen

Prasugrel	7dagen	7 uur na verwijderen catheter		7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
Ticagrelor	5 dagen	7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen bij catheter in situ	7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
VKA's	3 -5 dagen staken + INR <1.8	Geen, na verwijderen catheter mits INR <1.8	Niet aanbevolen met catheter in situ	Na verwijderen catheter mits INR <1.8. geen oplaaddosis	Niet aanbevolen
<b>LMWH in combinatie met</b>					
<b>LMWH therapeutisch</b>	<b>24 uur</b>	<b>24 uur na verwijderen catheter</b>	<b>Niet aanbevolen met catheter in situ</b>	<b>24 uur na verwijderen</b>	<b>Niet aanbevolen</b>
ASA + Dipyridamol sec profylaxe	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren
Clopidogrel	5-7 dagen	7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen bij catheter in situ	7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
Prasugrel	7dagen	7 uur na verwijderen catheter		7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
Ticagrelor	5dagen	7 uur na verwijderen catheter		7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
ASA sec profylaxe	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren
+ Clopidogrel	7 dagen	7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen bij catheter in situ	7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
Prasugrel	7dagen	7 uur na verwijderen catheter		7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
Ticagrelor	5dagen	7 uur na verwijderen catheter		7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
ASA + Dipyridamol sec profylaxe	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren
+ Clopidogrel	7 dagen	7 uur na verwijderen catheter		7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen

Prasugrel	7dagen	7 uur na verwijderen catheter		7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
Ticagrelor	5 dagen	7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen bij catheter in situ	7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
<b>Directe orale antistollingsmiddelen in therapeutische dosering in combinatie met</b>					
<b>Dabigatran</b>					<b>Gecontra-indiceerd</b>
<i>CrCl &gt;80</i>	<i>48uur</i>	<b>Na verwijderen catheter VTE profylaxe halve dosis na zes uur, therapeutisch na 24 uur.</b>	<b>Niet van toepassing bij catheter in situ</b>	<b>Zes uur bij VTE profylaxe halve dosis, 24 uur bij therapeutische dosis</b>	<b>Gecontra-indiceerd</b>
<i>CrCl 50-80</i>	<i>72 uur</i>				
<i>CrCl 30-50</i>	<i>96 uur</i>				
<b>Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban</b>					<b>Gecontra-indiceerd</b>
<i>CrCl 30-50</i>	<i>48 uur</i>	<b>Na verwijderen catheter VTE profylaxe na zes uur, therapeutisch na 24 uur</b>	<b>Niet van toepassing bij catheter in situ</b>	<b>6 uur bij VTE profylaxe 24 uur bij therapeutische dosis</b>	
				<b>Na verwijderen catheter VTE profylaxe halve dosering na zes uur, therapeutisch na 24 uur</b>	
ASA als sec profylaxe	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren	Continueren
Clopidogrel	5-7 dagen	7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen bij catheter in situ	7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
Prasugrel	7 dagen	7 uur na verwijderen catheter		7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
Ticagrelor	5-7 dagen	7 uur na verwijderen catheter		7 uur na verwijderen catheter	Niet aanbevolen
<b>Directe orale antistollingsmiddelen low-dose in kader Primaire preventie van veneuze trombo-embolie (VTE) bij volwassenen na een electieve totale heup- of knie vervangende operatie of preventie van recidief DVT en PE na 6 maanden in combinatie met</b>					

dabigatran, rivaroxaban, apixaban en edoxaban	Conform therapeutische dosering DOAC	Conform therapeutische dosering DOAC	Conform therapeutische dosering DOAC	Conform therapeutische dosering DOAC	Conform therapeutische dosering DOAC
ASA als sec profylaxe					
Clopidogrel Prasugrel Ticagrelor	Conform therapeutische dosering DOAC	Conform therapeutische dosering DOAC	Conform therapeutische dosering DOAC	Conform therapeutische dosering DOAC	Conform therapeutische dosering DOAC