



Proforma MRI rapport

Aanbevelingen voor een gestandaardiseerd MRI report' Resultaten van een evidence based consensus met 11 expert centers.

Primary staging

- Afstand van de anorectal junctie tot aan de distale tumor begrenzing
- Tumor lengte
- T & N stage
- indien N+ - het aantal hoog suspecte metastatische klieren
- Aanwezigheid en aantal van suspecte extramesorectale klieren
- Eventueel aanwezigheid van de mesorectale fascie en kortste afstand van de tumor tot aan de mesorectale fascie
- The circumferentiele locatie van de tumor in de rectum wand (e.g. lateraal, anterior, posterior)
- Eventueel aanwezigheid van extramurale vasculaire invasie (EMVI)
- Morphologisch aspect vd tumor (e.g. polypoid, mucineus , ulceratief , perforatie)

Restaging na CRT

- Afstand van de anorectal junctie tot aan de distale tumor begrenzing
- Tumor lengte
- Aan of afwezigheid van residuele tumor
- Aan- of afwezigheid van fibrosis
- yT-stage
- yN-stage en by yN+ aantal hoogsuspecte metastatische klieren zowel in het mesorectum als extramesorectaal
- Eventueel persisteren van invasie vd mesorectale fascie of evt tumor retractie en vrijgekomen fascie
- Kortste afstand tussen van de tumor tot aan de mesorectale fascie
- The circumferentiele locatie van de tumor in de rectum wand (e.g. lateraal, anterior, posterior)