GRADE Evidence Profielen

Medicamenteuze behandelopties ter vermindering van ernst en frequentie van Raynaud aanvallen

Fosfodiësterase-5-inhibitors (PDE-5i)

Certainty assessment							Aantal patiënten		Effect	Certainty	Importantie
Aantal studies	Studieopzet	Risk of bias	Inconsistentie	Indirect bewijs	Onnauwkeurigheid	Andere factoren	PDE5i	placebo	Absoluut (95% CI)		
Frequentie van Raynaud aanvallen (aantal per dag)											
6	gerandomiseerde trials	niet ernstig	niet ernstig	niet ernstig	zeer ernstig[b]	niet gevonden	173	177	MD **0.49 minder** (0.71 minder tot 0.28 minder)	⨁⨁◯◯ Laag	CRUCIAAL
Duur van Raynaud aanvallen (minuten per dag)											
6	gerandomiseerde trials	niet ernstig	niet ernstig	niet ernstig	ernstig[a]	niet gevonden	173	177	MD **14.62 min minder** (20.25 minder tot 9 minder)	⨁⨁⨁◯ Redelijk	CRUCIAAL
Ernst van Raynaud aanvallen: niet gerapporteerd Raynaud Condition Score											
6	gerandomiseerde trials	niet ernstig	niet ernstig	niet ernstig	zeer ernstig[b]	niet gevonden	173	177	MD **0.46 lager** (0.74 lager tot 0.17 lager)	⨁⨁◯◯ Laag	CRUCIAAL

Health Assessment Questionnaire Disability Index: niet gerapporteerd
Short form-36: niet gerapporteerd
Bijwerkingen: niet gerapporteerd

CI: *Confidence interval;* ***MD:*** *Mean difference; a. De ondergrens van 95% betrouwbaardheidsinterval is niet klinisch relevant, de puntschatting en bovengrens mogelijk wel, b. De puntschatting, bovengrens ondergrens van 95% betrouwbaarheidsinterval zijn niet klinisch relevant*