GRADE Evidence Profielen

Behandelopties t.b.v. genezing en/of preventie van digitale ulcera en verminderen van kritieke ischemie

Calciumantagonisten

Certainty assessment							Impact	Certainty	Importantie
Aantal studies	Studieopzet	Risk of bias	Inconsistentie	Indirect bewijs	Onnauwkeurigheid	Andere factoren			
Aantal digitale ulcera									
2	gerandomiseerde trials	niet ernstig	ernstig[a]	zeer ernstig[b,c,d]	niet ernstig	niet gevonden	In de studie van Rademaker (1989) verminderde in de nifedipine groep (n=11) het gemiddelde (SE) aantal digitale laesies van 4,3 (0,8) naar 1,4 (0,5; p<0,01). Er was geen significant verschil tussen groepen. In de studie van Lee (2014) was er geen vermindering in aantal digitale ulcera na de periode van behandeling met amlodipine (n=30).	⨁◯◯◯ Zeer laag	CRUCIAAL

Pijn - niet gerapporteerd
Noodzaak tot amputatie - niet gerapporteerd
Necrose - niet gerapporteerd
Handfunctie (SHAQ) - niet gerapporteerd
Voorkomen van superinfecties - niet gerapporteerd
Duur van ziekenhuisopname/aantal poliklinische bezoeken - niet gerapporteerd
Aantal nieuwe digitale ulcera – niet gerapporteerd

a. De twee studies hebben tegenstrijdige bevindingen, b. De interventie wordt niet vergeleken met placebo maar met een ander medicament, c. Een van de twee studies is zeer verouderd, d. Beide studies hebben een klein aantal patiënten.