

Isolatie-indicatietabel

Infectieziekte/ kolonisatie	Micro-organisme	Overdracht	Risico-inschatting	Type isolatie en maatregelen*	Duur isolatie
Acute luchtweginfectie	Onbekende verwekker	Druppel en contact	Zie verwekker waarvoor wordt verdacht	Druppel en contact	Tot klinisch herstel
Adenovirusinfectie	Adenovirus	Druppel en contact	Personen die niet hygiënebewust zijn	Druppel en contact	Tot genezing
Angina, keelontsteking, faryngitis, tonsillitis, pneumonie	Streptokokken groep A	Druppel en contact		Druppel en contact	Tot 24 uur na start effectieve therapie
Bacteriële luchtweginfectie	<i>Burkholderia cepacia</i>	Druppel en contact		Druppel en contact	Tot klinisch herstel, niet van toepassing bij dragerschap. Uitzondering: Transmissie van CF- patiënten die wel drager zijn van <i>B.cepacia</i> naar CF- patiënten die dat niet zijn wordt middels isolatie voorkomen.
Bacteriële luchtweginfectie	Meningokokken, <i>Neisseria meningitis</i>	Druppel en contact		Druppel en contact	Tot 24 uur na start effectieve therapie
Bacteriële luchtweginfectie	Multiresistente micro-organismen.	BRMO-richtlijn			
Bof	Bofvirus	Druppel		Druppel	Tot 9 dagen na begin van de zwelling
BRMO	<i>Acinetobacter calcoaceticus- baumanni</i> complex, carbapenemase	BRMO-richtlijn			
BRMO	<i>Acinetobacter calcoaceticus- baumanni</i> complex, geen carbapenemase	BRMO-richtlijn			
BRMO	<i>Candida auris</i> BRMO	BRMO-richtlijn			
BRMO	Enterobacterales BRMO, geen carbapenemase	BRMO-richtlijn			
BRMO	Enterobacterales carbapenemase (CPE)	BRMO-richtlijn			
BRMO	<i>Enterococcus faecium</i> BRMO (VRE)	BRMO-richtlijn			
BRMO	Methicilline- resistente	MRSA-richtlijn			

	<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)				
BRMO	Multiresistente micro-organismen	BRMO-richtlijn			
BRMO	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> BRMO	BRMO-richtlijn			
Cholera	<i>Vibrio cholerae</i>	Druppel en contact	Bij heftige diarree/ braken ook via druppels	Druppel en contact	Tot einde diarree/braken
Infectieziekte/ kolonisatie	Micro-organisme	Overdracht	Risico-inschatting	Type isolatie en maatregelen	Duur isolatie
<i>Clostridioides difficile</i> - infectie	<i>Clostridioides difficile</i>	<i>Clostridioides difficile</i> -richtlijn			
Conjunctivitis	Adenovirus of andere virale verwekker	Contact		Contact	Tot klinisch herstel
COVID-19, SARS-CoV-2	SARS-CoV virussen	Druppel en contact	Aergeen bij aerosolvormende handelingen	Druppel en contact (aergeen bij aerosolvormende handelingen)	Niet meer besmettelijk na COVID-19
Difterie Cutaan	<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	Contact	Cutaan	Contact	2x negatieve kweken na 48 uur staken antibiotische therapie
Difterie Luchtwegen	<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	Druppel en contact	Luchtwegen	Druppel en contact	2x negatieve kweken na 48 uur staken antibiotische therapie
Ebola	Ebolavirus	Virale hemorragische koorts richtlijn			
Echovirus infectie	Echovirus	Druppel en contact	Bij heftige diarree/ braken ook via druppels	Druppel en contact	Tot einde diarree/braken
Enterovirus infectie zonder neurologisch beeld	Enterovirus	Contact	Personen die niet hygiënebewust zijn	Contact	Tot einde klachten
Enterovirus infectie met neurologisch beeld Acute Flaccid Myelitis (AFM, acute slappe paralyse)	Enterovirussen: uit typering blijkt Enterovirus type D68	Druppel en contact	Bij heftige diarree/ braken ook via druppels	Druppel en contact	Tot einde diarree/braken, daarna contactisolatie tot 7 weken na de eerste ziektedag
Erysipelas	<i>Streptococcus pyogenes</i> (streptokok groep A)	Contact		Contact	Tot 24 uur na start effectieve therapie

Erythema infectiosum (5de ziekte),	Parvovirus B19	Druppel		Druppel	Tot 1 week na begin van huiduitslag
Fasciitis necroticans	<i>Streptococcus pyogenes</i> (streptokok groep A)	Contact		Contact	Tot 24 uur na start effectieve therapie en klinisch herstel
Folliculitis	<i>Staphylococcus aureus</i>	Contact	Personen die niet hygiënebewust zijn	Contact	Tot herstel
Gastro-enteritis	Adenovirus infectie	Druppel en contact	Bij heftige diarree/braken ook via druppels	Contact / Druppel en contact	Tot einde diarree/braken
Gastro-enteritis	Astrovirus	Druppel en contact	Bij heftige diarree/braken ook via druppels	Contact / Druppel en contact	Module Isolatieduur norovirus
Gastro-enteritis	<i>Escherichia coli</i> , entero-hemorragisch (EHEC/STEC)	Druppel en contact	Bij heftige diarree/braken ook via druppels	Contact / Druppel en contact	Tot einde klachten
Infectieziekte/ kolonisatie	Micro-organisme	Overdracht	Risico-inschatting	Type isolatie en maatregelen	Duur isolatie
Gastro-enteritis	Onbekende verwekker	Zie verwekker waarvoor wordt verdacht	Bij heftige diarree/braken ook via druppels	Contact / Druppel en contact	Zie verwekker waarvoor wordt verdacht
Gastro-enteritis	Onbekende verwekker	Druppel en contact	Personen die niet hygiënebewust zijn	Contact / Druppel en contact	Tot einde diarree/braken
Gordelroos / Herpes Zoster	Varicella Zoster Virus	Aerogeen en contact	Immuungecompromitteerde patiënt	Aerogeen en contact	Tot de laatste blaasjes zijn ingedroogd
Gordelroos / Herpes Zoster	Varicella Zoster Virus	Contact	Dermatoom niet afdekbaar	Contact	Tot de laatste blaasjes zijn ingedroogd
Griep, Influenza	Influenza A of B, aviaire of para influenzavirussen	Druppel en contact		Druppel en contact	Tot klinisch herstel
Hepatitis A	Hepatitis A virus	Feco-oraal		Contact	Tot 1 week na ontstaan van de symptomen
Hepatitis E	Hepatitis E virus	Feco-oraal		Contact	Tot negatieve PCR op feces
Herpes simplexvirus infectie	Herpes simplexvirus	Contact	Gedissemineerd	Contact	Tot korstvorming
Herpes simplexvirus infectie	Herpes simplexvirus	Contact	Mucocutaan ernstig	Contact	Tot korstvorming
Herpes simplexvirus infectie	Herpes simplexvirus	Contact	Neonataal	Contact	Tot korstvorming
Hoofdluis	Luizen	Contact		Contact	Tot herstel-tot ontluizing
Impetigo	<i>Staphylococcus aureus</i>	Contact	Personen die niet hygiënebewust zijn	Contact	Tot 48 uur na start effectieve therapie of

			of indien niet afdekbaar		tot laesies zijn ingedroogd
Humaan metapneumovirus infectie	Humaan metapneumovirus	Druppel en contact		Druppel en contact	Tot klinisch herstel
Invasieve streptokokkeninfectie (fasciitis necroticans, kraamvrouwenkoorts, sepsis)	<i>Streptococcus pyogenes</i> (streptokok groep A)	Contact		Contact	Tot 24 uur na start effectieve therapie
Kinkhoest	Bordetella pertussis	Druppel en contact		Druppel en contact	Tot 7 dagen na start effectieve therapie
Krim-congokoorts	Krim-congovirus	Virale hemorragische koorts richtlijn			
Lassakoorts	Lassavirus	Virale hemorragische koorts richtlijn			
Marburg	Marburgvirus	Virale hemorragische koorts richtlijn			
Mazelen	Mazelenvirus	Aerogeen en contact		Aerogeen en contact	Tot 7 dagen na het uitbreken van het exantheem. Immuungecompromiteerden: gedurende gehele ziekteperiode
Infectieziekte/ kolonisatie	Micro-organisme	Overdracht	Risico-inschatting	Type isolatie en maatregelen	Duur isolatie
Meningoencefalitis	<i>Haemophilus influenzae</i> type B	Druppel en contact	Druppel i.v.m. keeldragerschap	Druppel en contact	Tot 24 uur na start effectieve therapie
Meningoencefalitis	<i>Neisseria meningitidis</i>	Druppel en contact	Druppel i.v.m. keeldragerschap	Druppel en contact	Tot 24 uur na start effectieve therapie
Meningoencefalitis	Nog onbekende verwekker	Druppel en contact		Druppel en contact	Tot negatieve kweek of tot verwekker bekend is. Volg dan beleid van de verwekker
Meningokokkemie	Meningokokken, <i>Neisseria meningitidis</i>	Druppel en contact		Druppel en contact	Tot 24 uur na start effectieve therapie
MERS	MERS-CoV	Vermoedelijk via druppels		Aerogeen, Druppel en contact	Isolatie opheffen op basis van negatieve PCR
Mpox	Monkeypoxvirus	Druppel en contact		Druppel en contact	Tot alle korstjes van de huid zijn gevallen en er geen overige klachten meer aanwezig zijn

Norovirus infectie	Norovirus	Norovirus richtlijn	Bij heftige diarree/ braken ook via druppels	Druppel en contact	Tot minimaal 48 uur na de laatste klachten. Zie ook Module 1.2 Isolatieduur norovirus
Pest	<i>Yersinia pestis</i>	Druppel	Longpest		Tot 72 uur na start effectieve therapie
Polio	Poliovirus	Druppel en contact		Druppel en contact	Tot 7 weken na aanvang klachten
Rodehond	Rubella virus	Druppel en contact	Congenitaal	Druppel en contact	Tot 2x negatieve PCR van keel en urine na 3 maanden. Anders tot leeftijd 1 jaar
Rodehond	Rubella virus	Druppel en contact	Niet-congenitaal	Druppel en contact	Tot 7 dagen na de eerste dag van exantheem
Roodvonk	<i>Streptococcus pyogenes</i> (streptokok groep A)	Druppel en contact		Druppel en contact	Tot 24 uur na start effectieve therapie
Rotavirus infectie	Rotavirus	Druppel en contact		Druppel en contact	Tot einde klachten
RS-virus infectie	Respiratoir syncytieel virus (RS- virus)	Druppel en contact		Druppel en contact	Tot klinisch herstel
Salmonellose (incl. tyfus, paratyfus)	<i>Salmonella typhi</i> , <i>Salmonella paratyphi</i> , non- typhoidale <i>Salmonellae</i>	Contact	Personen die niet hygiënebewust zijn	Contact	Tot einde klachten
Sapovirusinfectie	Sapovirus	Druppel en contact	Bij heftige diarree/ braken ook via druppels	Druppel en contact	Module 1.2 Isolatieduur norovirus
SARS, SARS-CoV-1	SARS-CoV virussen	Druppel en contact		Aerogeen, Druppel en contact	Tot 10 dagen na het verdwijnen van de symptomen
Infectieziekte/ kolonisatie	Micro-organisme	Overdracht	Risico-inschatting	Type isolatie en maatregelen	Duur isolatie
Scabiës	Schurftmijt	Scabiës richtlijn			
Scabiës crustosa	Schurftmijt	Scabiës richtlijn			
Shigellosis, dysenterie	<i>Shigella dysenteriae</i>	Contact		Contact	Tot einde klachten
Tuberculose	<i>Mycobacterium tuberculosis complex</i>	Tuberculose richtlijn			
Virale luchtweginfectie	Coxsackievirus	Druppel en contact		Druppel en contact	Tot klinisch herstel
Virale luchtweginfectie	Enterovirussen	Druppel en contact	Personen die niet hygiënebewust zijn	Druppel en contact	Tot klinisch herstel

Virale luchtweginfectie	Parvovirus B19	Druppel		Druppel	Tot het begin van de huiduitslag
Waterpokken	Varicella Zoster Virus	Aerogeen en contact		Aerogeen en contact	Tot de laatste blaasjes zijn ingedroogd

** Indien er meerdere maatregelen zijn genoemd, waarvan sommige overlappen, pas dan de meest intensieve maatregelen toe. Zie module infectiepreventiemaatregelen van deze richtlijn.*