

Kennisvragen

Module Inleiding

Niet van toepassing

Module Diagnostiek

Er is nog meer onderzoek nodig om kristal bewezen jicht met echografie en DECT te vergelijken:

- Voor welke patiëntengroep is welk onderzoek (echo of DECT) geïndiceerd?
- Is echografie en of DECT van waarde bij patiënten met een asymptomatisch verhoogd urinezuur?
- Wat is de waarde van echo/DECT/Rx bij het onderscheid maken tussen topheuze en niet-topheuze jicht?
- Kan een gewrichtspunctie achterwege blijven als bij echografie voor jicht karakteristieke echografische afwijkingen worden aangetoond?

Module Acute jicht

- Huidige studies waarin de verschillende behandelingen (colchicine, NSAID en glucocorticoïden) zijn klein en resultaten niet altijd eenduidig. Bovendien is de vergelijking vaak indirect gemaakt. - Er zou een nieuwe studie moeten volgen met directe vergelijking tussen deze middelen om meer/beter bewijs te verkrijgen voor een voorkeur.
- Leidt een eerdere start tot het sneller onder controle krijgen van een jicht aanval?
- Verschil tussen direct i.a. injectie versus start colchicine of NSAID?
- Op welke moment is i.a. injectie bij ernstige topheuze jicht zinvol?
- Starten met monotherapie of al direct combinatie therapie?

Module Chronische jicht

Optimaal medicamenteuze behandeling

- Er is gebrek aan strategie studies.
- Wat is de meerwaarde van een treat-to-target behandeling in vergelijking met on-demand?
- Wat zijn de langere termijneffecten (effectiviteit en veiligheid) van een behandeling met ULT?
- Als men febuxostat opstart, is het dan (kosten)effectiever om er standaard gedurende drie of zes maanden profylaxe (colchicine, prednisolon) bij te geven?
- Als men febuxostat start, dient men dan profylaxe te geven bestaande uit NLRP3 remmer, anakinra, prednisolon of een lage dosis colchicine?
- Wanneer kan de medicatie worden afgebouwd, en op welke wijze dient de behandeling worden afgebouwd?

Optimale behandeling klinische remissie

- Moet bij jicht patiënten in remissie hetzelfde serum urinezuur target gehanteerd blijven worden als het target dat gehanteerd werd om remissie te bereiken? Of kan er na verloop van tijd een wijziging plaatsvinden zonder verandering in klinische uitkomsten?
- Wat is de economische last van ongecontroleerde jicht versus jicht in remissie in Nederland?

Module Leefstijl en comedicatie bij jicht

- Is leefstijlinterventie voor alle patiënten groepen hetzelfde of zijn er bij bepaalde subgroepen bepaalde leefstijlinterventies die de voorkeur hebben (bijv. DASH versus mediterrane dieet)?
- Wat is de kosteneffectiviteit van leefstijlinterventies?
- Kan asymptomatische hyperuricemie en dus uiteindelijk het risico op jicht worden beïnvloed door leefstijlaanpassingen en aanpassen van comedicatie?

Module CVRM bij jicht

Primaire preventie

- Is er verschil in cardiovasculair risico bij krachtige versus geen behandeling in de volgende patiëntprofielen gezonde jongeman (<40jr) met eerste jichtaanval, oudere man (>50jr) met hypertensie en/of overgewicht en/of glucose-dysregulatie (DM II) en/of verminderde nierfunctie (<50ml/min/1,7m²)?
- Verlaagt het gebruik van colchicine of een IL-1-remmer het risico op het ontstaan van hart- en vaatziekten bij patiënten met jicht?
- Wat zijn de voor-/nadelen van een behandeling met urinezuurverlagende therapie (ULT) in vergelijking met een controle behandeling voor de uitkomstmaten mortaliteit en het risico op ontstaan van cardiovasculaire bijwerkingen bij patiënten met jicht?

Secundaire preventie

De literatuur kan nog uitgebreid worden op de volgende vragen:

- Welk medicament kan het cardiovasculair risico verlagen bij patiënten met jicht en een zeker cardiovasculair risicoprofiel?
- Verlaagt het gebruik van colchicine het cardiovasculaire risico bij patiënten met jicht die in het verleden een cardiovasculair event hebben doorgemaakt. ?
- Wat is de additionele waarde van uraat verlaging?
- Wat is de effect size van remming van het NLRP3 inflammasoom?

Module Organisatie van zorg

- Wat is de waarde van eHealth interventies vergeleken met de huidige zorg bij patiënten met jicht?
- Wat is de waarde van thuismetingen met POCT binnen de organisatie van zorg bij jicht?