

Tabel 2. Overzicht van behandelopties met biologics en de expert beoordeling van hun geschiktheid in specifieke behandelomstandigheden

Therapie	Small molecule inhibitors	TNF-alfa-blokkers				anti-IL12/23	anti-IL17				anti-IL23			
	Apremilast	Etanercept	Infliximab	Adalimumab	Certolizumab	Ustekinumab	Secukinumab	Ixekizumab	Brodalumab	Bimekizumab	Guselkumab	Tildrakizumab	Risankizumab	
Specifieke omstandigheden														
Gelijktijdige artritis psoriatica***	↑↑	↑↑								*	****	↑↑	*	↑↑
Chronisch inflammatoire darmziekte: zieke van Crohn			↑↑ 1 ^e keuze				↓				↑ 2 ^e keuze indien TNF-alfa-blokkers niet voldoen			
Chronisch inflammatoire darmziekte: colitis ulcerosa	↑ 2 ^e keuze orale therapie		↑↑ 1 ^e keuze			↑↑ 1 ^e keuze	↓				↑ 2 ^e keuze indien TNF-alfa-blokkers niet voldoen			
Depressie	↓↓								↓**					
Diabetes/metabool syndroom														
Dyslipidemie														
(Gevorderd) hartfalen	↑	↓↓					↑							
Ischemische hartziekte			↑											
Gelijktijdige latente/ behandelde TBC	↑	↓↓					↑							
Zwangerschap	↓				↑ 1 ^e keuze biologic									

↑↑ = De werkgroep is van mening dat de meeste patiënten en hun behandelend dermatoloog deze keuze zouden moeten maken

↑ = De werkgroep is van mening dat de meeste patiënten en hun behandelend dermatoloog deze keuze zouden moeten maken, maar een substantieel deel niet

↓ = De werkgroep is van mening dat de meeste patiënten en hun behandelend dermatoloog hier niet voor zouden moeten kiezen, maar een substantieel deel wel

↓↓ = De werkgroep is van mening dat bijna alle patiënten en hun behandelend dermatoloog hier niet voor zouden moeten kiezen

*Geen registratie voor artritis psoriatica (PsA)

**De EMA heeft vastgesteld dat een causaal verband tussen behandeling met brodalumab en verhoogd risico op suïcidegedachten en suïcidaal gedrag niet kan worden vastgesteld, en de waarschuwing hieromtrent is in 2022 uit de SmPC-tekst verwijderd. De voordelen en risico's van een behandeling met brodalumab bij patiënten met een geschiedenis van depressie en/of suïcidale ideatie en suïcidaal gedrag, of bij patiënten die dergelijke symptomen ontwikkelen, dienen zorgvuldig te worden afgewogen.

***Werk samen met een reumatoloog bij het kiezen van de optimale therapie en bij het evalueren van de effectiviteit van de therapie indien een patiënt zowel psoriasis als PsA heeft.

****Bimekizumab is op 5 juni 2023 geregistreerd voor PsA; er heeft geen expert beoordeling door de werkgroep plaatsgevonden.