

Table 1. Point prevalence of psychiatric comorbidities in children and adolescents with autism spectrum disorder

Comorbidity	Studies included (n participants)	Countries (n studies)	% Participants with comorbidity (95% CI)	...	Risk of bias
ADHD	44 (113,044)	Verenigde Staten: 25 Nederland: 6 Iran: 3 Noorwegen: 3 Anders: 13	45% (32%-58%)	...	Low (26) to Moderate (16)
OCD	25 (29722)	Verenigde staten: 12 Nederland: 4 Noorwegen: 2 Anders: 11	10% (8%-12%)	...	Low (18) to moderate (3)
CD	NR	NR	NR	...	NR
DCD	2 (11857)	Verenigde staten: 2	87% (87-88%)	...	Low (2)
Depressie	26 (12396)	Verenigde staten: 11 Nederland: 4 Verenigd Koninkrijk: 4 Anders: 16	14% (9%-19%)	...	Low (19) to moderate (8)
Angst	34 (15,896)	Verenigde staten: 18 Nederland: 5 Noorwegen 4 Verenigd Koninkrijk: 3 Anders: 22	42% (34%-51%)	...	Low (23) to moderate (8)
Eetstoornissen	25 (13948)	VS: 10 UK: 2 Other: 15	42% (30%-54%)	...	Low (13) to moderate (9)
PTSS (trauma related stress disorder)	9 (19896)	Verenigde Staten: 5 Nederland: 3 Overig: 4	6% (0%-20%)	...	Low (12), moderate (9) or high (1)
Ticstoornis	23 (6655)	Verenigde Staten 6 Noorwegen: 2 Verenigd Koninkrijk: 2 Japan: 2 Turkije: 2 Anders: 8	14% (8%-21%)	...	Low (12), moderate (9) or high (1)
Leerstoornissen	NR	NR	NR	...	NR
Language disorder	2 (4442)	US: 2	39% (38%-40%)	...	Low (2)
Verstandelijke beperking	18 (100359)	VS: 8 Anders: 10	35% (28%-43%)	...	
Suïcidaliteit	NR	NR	NR	NR	NR

Abbreviations: ADHD; Attention-deficit/hyperactivity disorder, CD; conduct disorder, DCD; developmental coordination disorder, NR; not reported, PTSS; Posttraumatische stressstoorni